


● 新 品 種

■ あの美味しいスズマル納豆が線虫に強くなって新登場！
「中育69号」



■ 牛も喜ぶ！糖含量の高いオーチャードグラス「北海30号」



「北海30号」は、収穫（放牧）後の再生が良好

2番草の生育状況



「北海30号」は、「ハルジマン」に比べて、すじ葉枯病による葉枯れが少ない

● 新 技 術

■ 飼料自給率up! 黒毛和牛にサイレージ



現地実証での育成牛への牧草サイレージ給与



牧草サイレージ給与牛の枝肉
(枝肉重量455kg、BMS No.9、A5)

■ 味はナッツ！タネを食べるペポかぼちゃのつくり方



「ストライプペポ」の収穫期の圃場の様子



果実



種子

■ これでバッチリ！「ゆめちから」の栽培法決定版



雪が降る前の「ゆめちから」



大きくなって穂が出ました




さあ、収穫です！

● 新 技 術

■ 有機栽培畑の地力増進！緑肥の上手な活用法



アカクローバ（休閒緑肥）



えん麦（休閒・後作緑肥）



休閒緑肥導入による
スイートコーンの生育

アカクローバ
を前2カ年作付

緑肥無作付

■ 抵抗性ネギアザミウマのあたらしい防ぎ方



ネギアザミウマ

全道でピレスロイド剤が効かない、抵抗性ネギアザミウマが確認されています



ながねぎ被害

白いかすり状の斑点
になり商品価値が低下します




キャベツ結球部被害

黄色から茶色に変色して、著しい場合は「黒ゴマ症状」と呼ばれる黒い斑点になり商品価値を失います

● 現地普及活動事例

■ 水稲と転作を組み合わせた4年輪作への挑戦





人工衛星を利用した精密農業



基盤整備田における補助暗渠
(平成17年度奨励技術)

■ 「こんな災害にはこう対処すればいい!」



農業気象災害追跡調査
データ集のフォルダ構成