育種事業課題名:ばれいしょ新品種候補系統「北育1号」の概要 担当研究室:北海道立北見農業試験場・作物研究部・馬鈴しょ科

キーワード・ジャガイモ、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、早生白肉、サラダ適性 1.特性一覧表 系統名 ばれいしょ「北育1号」 組合せ Pentland Dell x とうや

特性 長所 1.ジャガイモシストセンチュウ抵抗性である。

- 2.早生白肉で「男爵薯」より収量が多い。
- 3.「男爵薯」より中心空洞、打撲黒変の発生が少ない。 4.調理品質が優れサラダ適性がある。 短所 1.上いも平均一個重がやや小さい。

採用県及び普及見込み	┢面積	北海道	1,000h	na					
調査地		北見鼎	農試		十勝農試				
調査年次	平成11,12		平成12	.,14年	平成11	1,12,14,15	5年	平成12,14	,15年
項目 累魏克	北育1号	男爵鸝)	北育1号	能較)	北育 1 号	男顥	事北	育1号	翻
		(* 2*****)		()		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(,
早晩性	早生	早生	早生	中生					
枯凋期 (月日)	9/5	8/30	9/9	9/27	8/27			8/26	9/8
終花期の 茎長(cm)	51 12.0	34 9.5	50 13.0	54 9.6	59 12.5	42 10.		59 12.5	58 7.7
株当たり上いも数(個/株) 上いも重(kg/10a)	4,750	3,700	4,819	5,119	4,421			4,492	3,706
対標準比(%)	128	100	94	100	126	100		121	100
中以上いも重(kg/a)	4,008	3,099	4,001	4,875	3,632			3,717	3,496
対標準比(%)	129	100	82	100	124	100		106	100
上いも平均一個重(g)	86	84	84	116	80	80		81	110
でん粉価(%)	16.3	16.2	16.0	16.4	15.0	14.		15.0	14.9
品種・系統名	北育1号	男爵薯 (対照)	さやか (比較)	調査地調査年	\ \ 7	全試験箇		北見農試	
塊茎の特性		(別!!()	(LLTX)	調査 中 品種・		平成11,12 北育1号	,14,15年 男爵薯	平成12, 北育1号	14,15年 さやか
形	扁球	球	呵		水沁口	ル目・写	(対照)	ル目「石	(比較)
皮色	白黄	白黄	白	枯凋期	(月日)	8/28	8/24	8/23	8/31
肉色	白	白	白	終花期	の茎長	57	42	51	53
目の深さ	やや浅	深	浅		m)				
休眠期間	サや長	サや長	サや長	株当た		11.9	10.1	13.1	9.2
褐色心腐の多少*	微 強	微 弱	無中	上いも					
打撲黒変耐性 中心空洞の多少*	微	少	無	(1回) 上いも	/株) =	4,522	4,038	4,857	4,623
二次生長の多少*	微	微	無		≇ ′10a)	4,322	4,030	4,007	4,023
調理特性*	p.44	pw	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	対標準	比(%)	112	100	105	100
煮崩れ	少	中	少	中以上	いも重	3,710	3,416	3,958	4,200
剥皮褐変	微	少	少		10a)				
調理後黒変	微	业业	业	対標準		108	100	94	100
肉質 舌ざわり	やや粘 中	やや粉や物	中中	上いも ³ 一個重		85	90	83	113
60177	中上	中上	中	でん粉		15.0	14.7	14.8	14.2
チップ・フライの褐変程度	多	中	中	2.01/3	· · · · · ·		1	1	1
サラダ適性	適	適	適						
病虫害抵抗性***									
シ゛ャカ゛イモシストセンチュウ	強(<i>H1</i>)	弱(<i>h</i>)	強(<i>H1</i>)			験結果に			
疫病抵抗性推定遺伝子型	R2 '	r	R1R3	_ <u>+</u>		iして判定 【験の成績			
塊茎腐敗	強	弱	やや強	1 ਹ	はほんだい	〜 大の水源 ・ 病抵抗性	は特性	。 検定の結 _:	果を
Yモザイク病	弱	弱	弱	種	ハミフル 苗特性分	類調查報	告の階	級に換算	した
そうか病 ************************************	弱弱	弱。	弱。	評					
粉状そうか病****	羽羽	弱	弱						

2.ばれいしょ「北育1号」の特記すべき特徴

ばれいしょ「北育1号」は、早生の生食用系統である。ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持つ。 熟期は「男爵薯」より5日程度遅く、収量は「男爵薯」より多い。塊茎の形は扁球で、肉色は白である。中心空洞および打撲黒変発生は「男爵薯」より少ない。水煮後の肉質はやや粘質で、煮崩れ、調理後黒変は「男爵薯」より少ない。サラダ適性を有する。

3.優良品種に採用しようとする理由

近年、ばれいしょの重要病害虫であるジャガイモシストセンチュウの発生が拡大しており、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の必要性が改めてクローズアップされているが、生食用ばれいしょの主力品種である「男爵薯」は抵抗性を持たない。そのため、「男爵薯」のかわりとなる早生白肉で、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持つ品種が求められている。


これまで、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性の生食用ばれいしょとしていくつかの品種が育成されてきたが、未だに早生白肉の抵抗性品種は育成されていない。昭和 62 年に育成された「キタアカリ」および平成 4 年に育成された「とうや」は早生ではあるが黄肉であるため、白肉である「男爵薯」が多くを占める生食用ばれいしょ市場の中では扱いが限られる。平成 7 年に育成された「さやか」は、白肉で、「男爵薯」より剥皮歩留まり、煮崩れ、調理後黒変等で優れた調理加工特性を有することから、業務加工用、特にポテトサラダ用として「男爵薯」に少しずつ置き換わってきているが、中生であり、畑輪作体系上扱いにくい面がある。

「北育」号」はジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持つ早生白肉の生食用系統である。早生であるため、秋まき小麦の前作として無理のない輪作体系を維持することが可能である。また、「男爵薯」より収量性が優れ、中心空洞などの生理障害が少ない。青果用としては、肉質が粘質であるため煮崩れにくく煮物等に最適である。一方でん粉価は「男爵薯」並に高く、ほくほくしたおいしい食味も有し、煮物以外としても汎用性がある。また近年粘質系の人気も高まっており、本系統の青果市場における位置も確立できると期待される。業務加工用としては「男爵薯」より調理加工品質が優れ、業務加工実需者等(ばれいしょ加工適性研究会)によるサラダ適性試験において「男爵薯」および一般サラダに使われている「トヨシロ」以上の評価を得ており、チルド適性試験においても「男爵薯」以上の評価を得ているので、生食用新品種普及の問題点である販路の確保を、青果用の他に業務加工用で図ることが可能である。

これらのことから、ジャガイモシストセンチュウ発生の拡大が懸念されている網走・十勝管内を中心として、「男爵薯」の一部に置き換えて普及することにより、ジャガイモシストセンチュウ汚染拡大防止、生食用ばれいしょの安定生産および畑輪作体系の安定に寄与するものと考える。

4.普及見込み地帯

北海道の生食用ばれいしょ栽培地帯



普及見込み地帯における「北育1号」の中以上いも重の「男爵薯」対比(%)

5.栽培上の注意

- 1)メトリブジン系の除草剤を植え付け後に散布すると、薬害を生じる場合がある。
- 2)疫病抵抗性であるが、抵抗性を侵す新レース出現の可能性があるため「男爵薯」に準じた防除を行う必要がある。
- 3) 「男爵薯」より塊茎の維管束褐変が発生しやすい傾向があるので、乾燥しやすい圃場で栽培する場合は注意する。