




ユウヅル フタナガハ



ユウヅル フタナガハ




表1. 生育特性

試験地	品種名	開花期 (月日)	成熟期 (月日)	主茎長 (cm)	分枝数 (本/株)	子実収量 (kg/a)	同左比率 (%)	百粒重 (g)
育成地	フクナガハ	7.31	10.20	82	－	34.8	113	36.1
	ユウヅル	7.30	10.17	67	－	30.8	100	40.7
岩手県 農試	フクナガハ	7.18	10. 3	64	2.7	31.3	120	36.3
	ユウヅル	7.24	10. 5	64	4.3	26.1	100	28.0
岩手県農試 県北分場	フクナガハ	7.19	10. 1	77	2.9	28.8	105	36.6
	ユウヅル	7.25	10. 4	71	4.3	27.4	100	29.9

品種名	生育中の障害			病害虫抵抗性				障害粒		
	倒伏	蔓化程度	ウイルス	マメシンクイガ	黒痘病	ダイズわい 化病	ダイズシスト センチュウ	紫斑	褐斑	裂皮
フクナガハ	無	－	－	弱	強	弱	－	微	微	無
白目長葉	微	－	－	弱	強	弱	－	微	微	微

注1. 育成地及び岩手県農試はS51～55、岩手県農試県北分場はS52～55における平均値

注2. 生育中の障害及び障害粒は岩手県農試、病害虫抵抗性：マメシンクイガは北海道立中央農試原原種農場、黒痘病は岩手県農試、ダイズわい化病は北海道立中央農試の結果である。

表2. 品質特性(育成地)

品種名	粗蛋白質 含量(%)	粗脂肪含 量(%)	子実の特性				
			粒形	大小	種皮色	臍色	品質
フクナガハ	－	－	扁球	大の中	黄白	黄	中上～上下
白目長葉	－	－	球	中の大	黄白	黄	中上

注1. 子実の特性は岩手県農試における調査結果である