

北海道登録品種一覧

I 普通作物

- 注 1. 農林省登録品種には、・印をつけた。
2. 系統番号の欄には、系統名、種苗台帳番号、原名をあてた。
3. 登録年の()は、優良品種決定年である。

1 水 稻

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
農 林 20 号*	北海 86 号	水稻 北海道うるち第1号	1971 (1941)	1974	上川支場	「農林1号」× 「胆振早稲」	早生、多収
栄 光	上育B18号	水稻 北海道うるち第2号	1971 (1942)	1974	上川支場	「鶴亀」× 「早生富田」	多収、良質、良味
巴 ま さ り	渡育 120号	水稻 北海道うるち第3号	1971 (1951)		渡島支場	「東北14号」× 「北海87号」	晩生、分けつ多く、多収、 食味良
南 栄	渡育 129号	水稻 北海道うるち第4号	1971 (1951)	1972	渡島支場	「巴錦」×「農林 20号」	晩生、長稈、食味良、冷水抵 抗性強
ユ ー カ ラ*	北海 182号	水稻 北海道うるち第5号	1971 (1962)		北海道農試	「関東53号」× 「栄光」	初期生育旺盛、強稈、良質多 収、多肥栽培で増収、いもち 病N菌に強
し お か り	上育 234号	水稻 北海道うるち第6号	1971 (1963)		上川支場	(「目黒榮橘」× 「共和」)F ₁ × 「共和」	早生、登熟良、いもち耐病性 中、耐倒伏性中、障害型耐冷 性やや弱
ほ う り ゅ う	空育 24号	水稻 北海道うるち第7号	1971 (1964)		空知支場	「新榮」× 「照錦」	中生、中肥で多収、食味・品 質良好
う り ゅ う	空育 22号	水稻 北海道うるち第8号	1971 (1965)		中央農試	「石狩白毛」× 「晩」	短稈、耐冷性・耐病性強、良 質、中生の早、初期生育不良
き よ か ぜ	上育 254号	水稻 北海道うるち第9号	1971 (1965)		上川農試	「新榮」×「水稻 農林15号」	極早生、良質、いもち耐病性 弱、耐倒伏性やや弱、障害型 耐冷性やや強
ひ め ほ な み	空育 39号	水稻 北海道うるち第10号	1971 (1966)		中央農試	「空系26号」× 「ヤチミノリ」	中生の晩、穂数型、いもち耐 病性やや強、良質、多収、初 期生育旺盛
ほ く せ つ	上育 265号	水稻 北海道うるち第11号	1971 (1966)	1972	上川農試	「新榮」×「上育 161号」(大同早生 ×福橘)	中生、登熟良、いもち耐病性 中、耐倒伏性やや強、障害型 耐冷性極強
そ ら ち	空育 51号	水稻 北海道うるち第12号	1971 (1967)		中央農試	「空育12号」× 「みまさり」	中生の中、安定多収
は や ゆ き	北育 33号	水稻 北海道うるち第13号	1971 (1968)	1975	北見農試	「新榮」×「水稻 農林19号」	耐冷性極強、いもち耐病性弱
か ち ほ な み	十育 12号	水稻 北海道うるち第14号	1971 (1968)		十勝農試	(「豊光」×「大雪」) ×「上育161号」	中生、安定多収、倒伏し難い
な る か ぜ	上育 314号	水稻 北海道うるち第15号	1971 (1970)	1979	上川農試	「北海182号」× 「ささほなみ」	早生、良質、いもち耐病性中、 耐倒伏性中、障害型耐冷性や や強
マ ツ マ エ*	北海 222号	水稻 北海道うるち第16号	1971 (1970)		北海道農試	「ふ系51号」×「 北海183号」	晩生、偏穂数型、強稈、いも ち耐病性強、良質多収、食味 やや良好
ゆ う な み	空育 87号	水稻 北海道うるち第17号	1971		中央農試	「ユウカラ×ささ ほなみ」F ₁ ×「さ さほなみ」	中生の早、短稈穂数型、いも ち耐病性やや強、障害型耐冷 性中、耐倒伏性やや強
イ シ カ リ*	道北 1号	水稻 北海道うるち第18号	1971		上川農試	「北海182号」× 「空育4号」	多収、良質、草姿良、いもち 耐病性強、耐倒伏性強、耐冷 性やや強
ユ キ モ チ*	北海 125号	水稻 北海道もち 第19号			上川支場	「大同早生」× 「福橘」	中生、中稈、穂数型、稀短芒、 良質、多収
か む い も ち	上育 266号	水稻 北海道もち 第20号	1971 (1965)		上川農試	「新榮」×「上育 161号」	糯、早生、良質、いもち耐病 性中、耐倒伏性やや強、障害 型耐冷性やや強

草 型	茎		穂						玄 米			品 質	食味	栽培 歩合	栽 培 適 地
	長短	強弱	長短	粒着 密度	稃色	稃先 色	芒の 有無	芒の 長短	形状	大小	色 沢				
中間型	長	や強	中	密	淡黄 白	赤褐	無	—	中	中	銚良	上の下	上	—	道北、道東北地方、これに準 ずる山間地の中生種、道央の 早生種
穂数型	や短	や強	中	や密	黄白	黄白	有	短少	中	中	銚白	上の中	上 下	—	道中央部
穂数型	や長	中	中	や密	黄白	赤	無	—	中	中	淡銚良	中の中	上	—	道南の温暖地帯、特に日本海 沿岸
穂重型	や長	強	中	や密	黄白	赤褐	無	—	中	中	濃銚良	中の下	上	—	道南温暖地帯
穂数型	短	強	中	や疎	黄白	黄白	無	—	や長	や大	淡銚	極 良	良	—	道央部、これに準ずる肥沃地
偏穂数 型	中	中	や短	や密	黄白	黄白	有	中 の中	や円	や小	や銀白	中の上	良	—	上川、留萌および網走
穂数型	中	中	や長	や密	黄白	暗褐色	無	—	中	中	純白	良	良	89.0	石狩、空知、胆振、日高の「榮 光」の栽培されている地帯
中間型	短	中	中～ や長	や密	黄白	黄白	無	—	中	中	鈍銀白	良	良	88.8	空知中央部、上川北部および これに準ずる地帯
中間型	中	や弱	中	や密	黄白	黄白	極稀	極短	中	中	や銚	上の下	良	—	上川、留萌の北部および中央 部の山間地帯、ならびにこれ に類似の地帯
穂数型	短	中	短	密	黄白	黄白	無	—	や円	や小	鈍銀白	良	良	86.5	空知、石狩、上川の道央部 および類似の地帯でとくにいも ろ病発生地帯
穂数型	中	や強	短	中	黄白	黄白	有稀	稀短	中	中	や銚	上の下	良	—	上川中南部、留萌南部、空知 全域およびこれと類似の地帯
穂数型	や短	中	や長	中	黄白	黄白	無	—	中	中	鈍銀白	や良	—	—	中生種の作付されている道内 各地帯、ならびに中晩生種地 帯の冷水田
中間型	長	や弱	中	中	黄白	黄白	少	短	中	中	や鈍白	中の中	—	—	網走の「農林20号」栽培地帯 および十勝、上川北部、留萌 北部の類似地帯
	や短	中～ や弱	短	や密	黄白	黄白	無	—	や円	や小	や良	中の上	—	93.0	十勝、網走の全域、上川北部 ならびにこれに準ずる地帯
穂数型	や短	や強	中	中	黄白	黄白	無	—	中	中	や良	上の下	良	89.4	網走、十勝の良地帯、上川、 留萌の山間部、道央部の早生 地帯
偏穂数 型	中	剛	長	中	黄白	淡褐色	有 極稀	極短	中	や大	淡銚	良	や良	91.0	渡島半島南部良地帯
穂数型	短	や剛	や長	や密	黄白	黄白	無	—	中	中	鈍銀白	上の下	や良	91.0	空知、石狩の「ほうりゅう」 の安全栽培良地帯、ならびに 類似地帯
偏穂数 型	短	剛	長	中	黄白	黄白	無	—	や長	や大	や銚	上の下	良	90.9	上川、留萌のやや良～良地帯、 空知、石狩、後志、松山のや や良地帯
穂数型	中	や強	中	や密	黄白	黄白	有	稀短	中	中	白	上の下	良	—	道央部
偏穂数 型	や短	や強	や短	中	黄白	黄白	や少	や短	中	中	白	上の下	良	—	上川中北部、留萌全域、空知 北部

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
工 藤 結		水稻 北海道もち 第21号	1971 (1965)		道南農試	「南結」×「多福結」	中生の晩、中稈、穂重型、いもち耐病性強
おんねもち	北育結47号	水稻 北海道もち 第22号	1971 (1970)		北見農試	「北海182号」× 「上育230号」	良質、「もち」良質、多収、耐 冷性やや強、いもち耐病性や や弱～弱
きたこがね	北育 51号	水稻 北海道うるち第23号	1973		北見農試	「北海182号」× 「上育230号」	やや良質、耐冷性やや強、多 収。いもち耐病性弱
さ ち ほ	空育 97号	水稻 北海道うるち第24号	1974		中央農試	「ささほなみ×空 系1号」F ₁ ×「北海 190号」	良質、登熟早い、いもち病は 場抵抗性強、強稈性
キタヒカリ*	北海 230号	水稻 北海道うるち第25号	1975		北海道農試	「しおかり」× 「ユウカラ」	中生、偏穂数型、良質、食味 良好、少肥瘠地栽培で少収、 機械化栽培に適する
ともゆたか	北育 103号	水稻 北海道うるち第26号	1977		中央農試	「北海222号」× 「道北1号」	中生の早、短穂穂数型、初期 生育良好、多収、粒揃良好、 割れ穂多
はやこがね	空育 64号	水稻 北海道うるち第27号	1977		北見農試	「北斗」×「上育 272号」	良質、耐冷性強、いもち耐病 性中～やや弱

2 大 麦

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
春 星	6 号	大麦 北海道春 第1号	1971 (1953)	1975	北見農試	「ハルビン2条」 ×「ボヘミヤ8号」	2角直立種、子実は殻皮やや 厚し、醸造用に適す
ほしまさり	訓系 16号	大麦 北海道春 第2号	1972		北見農試	「春星」× 「女系8号」	大粒、良質で極めて多収醸造 用に適する

3 裸 麦

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
マリモハダカ	北海春裸 13号	裸麦 北海道春第1号	1971 (1966)		北見農試	「サナダ麦」× 「北統3号」	強稈、良質、耐病性強、多収、 多条播適応性大

4 ライ麦

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ベトクーザ		ライ麦 北海道輪第1号	1971 (1939)		ド イ ツ	ドイツより輸入し た種子を供試	長稈、多けつ、耐倒伏、良質 多収、耐寒性、赤さび病や赤 かび病にやや弱い

草型	茎		穂							玄米		品質	食味	揚精歩合	栽培適地
	長短	強弱	長短	粒着密度	稃色	稃先色	芒の有無	芒の長短	形状	大小	色沢				
穂重型	中	剛	長	や密	黄白	黄白	無	—	中	小	白	や良	良		渡島、松山南部、胆振沿岸地帯
穂数型	や短	や強	中	中	黄白	黄白	や少	短	中	中	白	中の上 —上	良		網走、十勝および上川、留萌の北部で「はやもち」、「双豊穂」の作付け地帯
偏穂数型	や短	や強	中	中	黄白	黄白	中	中	中	や大	白	上の中	中— や良		網走、十勝の中生種が作付けされている地帯
偏穂数型	や短	強	中	や密	黄白	黄白	極稀	極短	長	や大	良	上の中	や良	89.0	空知、石狩、後志、胆振、日高、道南北部、上川南部の中 生種地帯
偏穂数型	や短	や強	や長	中	黄白	黄白	無	—	中	中	淡白	良	良	90.0	留萌南部、上川中南部、道央部、道南北部の移植栽培、中央部良地帯の機械移植栽培
穂数型	短	や剛	や長	や密	黄白	黄白	極稀	極短	や長	や大	や濃白	上の中	や良	91.0	道央部、道南北部、上川・留萌の中南部の平坦部
穂数型	短	中	短	中	黄白	黄白	極稀	極短	や円	中	淡白	上の中	中— や良		網走、十勝、上川北部、留萌中北部および類似の早生種の作付け地帯

幼苗色	穂の			芒の			子実の		耐倒伏性	栽培適地
	型	粒着密度	下垂度	有無	長短	色	大小	色		
濃緑	二条矢羽根型	や密	や垂	有多	長	黄	大	黄白	や弱	全道の二条大麦を栽培している地域
濃緑	二条矢羽根型	や密	中	有多	長	黄	大	黄白	や弱	全道の二条大麦を栽培している地域

穂の		芒の			子実の		耐倒伏性	栽培適地
型	粒着密度	有無	長短	色	大小	色		
6条(4角)	疎	多	長	黄	中	白	強	網走、上川

穂の強弱	穂型	芒の		粒の		製粉歩合(%)	越冬歩合(%)	栽培適地
		長短	多少	大小	色			
強	短大	長	多	大	灰青緑	91.4	92.0	全道一円に適する

5 小 麦

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ハルヒカリ	北見春2号	小麦 北海道春第1号	1971 (1965)		北見農試	「Midax Pilot」× 「春播小麦農林75号」	各種さび病に強く、耐倒伏性 もやや強、品質はすこぶる良い
ハルミノリ	北見春17号	小麦 北海道春第2号	1971 (1969)		北見農試	「硬質小麦農林42 号」×「北育1号」	耐倒伏性やや強、さび病以外 の病害には比較的強く、安定 多収である
ホクエイ	本系 331号	小麦 北海道秋第3号	1971 (1954)	1978	北見支場	「赤錆不知1号」 ×「東北67号」	短稈、強稈、耐寒、耐病性強 く安定、粉質劣る、多収
改良伊達早生		小麦 北海道秋第4号	1971 (1957)	1975	渡島支場	伊達町広瀬弘夫氏 栽培の「伊達早生 小麦」から選抜	極早生、短稈、耐倒伏耐病性強、 間作に適する、耐冬性劣る
ムカコムギ	北見 11号	小麦 北海道秋第5号	1971 (1968)		北見農試	「Kanred × ナンブ コムギ」×「北成 9号」	黒目粒発生少、原粒性状・小 麦粉性状ともにすぐれ、やや 多収
イービス	(IBIS)	小麦 北海道秋第6号	1971 (1970)		北見農試	オレンジより導入	晩生、耐倒伏性極強、耐冬性 弱、アミロ粘度高い
ホロシリコムギ	北見 23号	小麦 北海道秋第7号	1974		北見農試	「北系8号」× 「北海240号」	短強稈、耐倒伏性強、穂重型、 多収、多肥密植で増収
タクネコムギ	北見 30号	小麦 北海道秋第8号	1974		北見農試	「東北118号」× 「北系221号」	早生、短稈、耐倒伏性強、粒の 外見品質良、アミロ粘度高い

6 えん麦

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
前 進	(原名) オンワード	えん麦 北海道輪第1号	1971 (1942)		北海道農試	—	早熟、草丈やや低く、強稈、 穂は長く中間型過熟になると 穂首から折れ易い、稈節は高く、 多収
ホ ナ ミ	「本系68号」	えん麦 北海道 第2号	1971 (1959)		北海道農試	「黒実」×「ビク トリー1号」	草丈低く強稈、稈節は「前進」 より少ない
オ ホ ー ツ ク	北海 1号	えん麦 北海道 第3号	1971 (1966)		北海道農試	「ホナミ」× 「前進」	やや晩生、散穂、強稈、耐倒 伏性強
モ イ ワ	北海 7号	えん麦 北海道 第4号	1973		北海道農試	「S84×Milford」 ×「前進」	散穂、やや早生、やや短稈、 多収良質

7 とうもろこし

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ゴールドエン クロスバントム	ゴールドエン クロスバントム	とうもろこし 北海道 第1号	1971 (1956)		米 国 (北海道農試)	「P39」× 「P51B」	中生の晩、生食加工用、優良質
イエロースイート	札交 5207	とうもろこし 北海道 第2号	1971 (1959)	1975	北海道立農試	「(C13×C30)」× 「セルボア」	早生、生食用、良質
タナバタワセ	札交 5322	とうもろこし 北海道 第3号	1971 (1959)	1975	北海道立農試	「黄早生」× 「C13」	極早生、生食用
ゴールドエン ビューティ	ゴールドエン ビューティ	とうもろこし 北海道 第4号	1971 (1963)		米 国 (北海道農試)	「C13」× 「Ma 21547」	極早生、生食加工用
ホワイトワキシー	マンモスホワ イトワキシー	とうもろこし 北海道 第5号	1971 (1966)	1975	北海道立農試	「(S339×マンモスホワ イトデントコーン) × 「マンモスホワイ デントコーン」	加工用、糯種

叢性	株の開閉	穂の		芒の		稈色	粒の			稈質	製粉性	耐病性		耐倒伏性	栽培適地
		型	粒着密度	有無多少	色		形	大小	色			赤さび病	うどんこ病		
	閉	錐	粗	長多	白	白	中	大	赤	硝子質	や良	強	中	や強	全道栽培可能。硬質小麦としての特性上主に網走、上川
	中	錐	粗	長多	白	白	中	大	赤	硝子質	中	中	中～や強	や強	網走、上川およびこれに準ずる地域
中間	閉	紡錐	中	無	—	褐	短	大	赤	中間質	—	強	中	強	十勝、網走支庁管内の肥沃地
直立	閉	紡錐	中	無	—	黄白	中	大	赤	中間質	—	や強	—	極強	道南地方の限定
中間	閉	錐	や粗	短頂芒	褐	褐	中	大	赤	中間質	や良	や強	中	や強	道南の極旱生地帯を除き全道、とくに網走・十勝
匍匐	閉	棒	密	無		白	短	大	赤	粉状質～中間	や良	中	や強	極強	新里郡、網走郡（美幌、津別を除く）網走市南網走、その他冬枯れ少地帯
直立	閉	棒	密	無		白	短	大	赤	中間質	中	中	中	強	道南の極旱生地帯除き全道、とくに肥沃地
中間	や開	錐	中	無		褐	短	大	赤	硝子質	中	中	中	や強	早生品種として全道、とくに道央以南

幼苗の			稈		芒の有無		穂		粒		耐倒伏性	栽培適地
姿勢	葉色	葉巾	細太	剛柔	長	短	型	粒着密度	大小	色		
直立	や濃緑	中	や太	強	多長		中間	密	中	淡灰	強	全道一円
直立	濃緑	中	中	強	少中		散穂	密	中	淡黄白	強	さび病多発地帯を除く、全道一円
直立	濃緑	中	中	剛	中長		散穂	密	中	淡黄	強	宗谷、留萌、根釧のほか道内の倒伏頻発地帯
直立	緑	中	中	中	無		散穂	や密	中	淡黄	中	全道

初期生育	分けつの多少	稈の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の種別	粒色	絹糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
中	多	中	弱	中	S	黄	無	無	道中央、道南
中	多	短	弱	低	S	黄	紅	紅	ゴールデンバントム栽培地帯
良	中	極短	中	低	F.S混	黄	淡紅	無	都市近郊の早出し生食用
や良	微	極短	中	低	S	黄	淡紅	無	全道
—	—	長	中	高	W	白	—	—	道央、道南

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
複 交 4 号	W 275	とうもろこし 北海道 第6号	1971 (1957)	1975	北海道立農試	「(W9×WM13 R)」×「(W49× W11)」	早生、デント子実用、多収
交 4 号*	月交 193号	とうもろこし 北海道 第7号	1971 (1957)	1978	北海道農試	「(N21×N19)」× 「T6」	早生、フリント子実用、初期 生育良
交 6 号*	月交 431号	とうもろこし 北海道 第8号	1971 (1962)		北海道農試	「(D103×D405)」 ×「(T102×T107)」	中生、セミデント、耐倒伏性
ジャイアンツ	本交 3304	とうもろこし 北海道 第9号	1971 (1962)	1978	北海道立農試	「(WF9 ⁻¹ ×W 22)」×「青森エロ ーデント」	晩生、デント、採種易
交 8 号*	長交 347号	とうもろこし 北海道 第10号	1971 (1968)	1979	長 野 (十勝農試)	「岩手エローデ ント」×「W531- (455×466)」	晩生、初期生育良
ヘイゲンワセ*	道交 16号	とうもろこし 北海道 第11号	1973		十 勝 農 試	「(N19×CM7)」 ×「(W41A×W79 A)」	早生、強稈、機械化向
ホ ク ユ ウ*	北交 22号	とうもろこし 北海道 第12号	1974		北海道農試	「(N85×N21)」× 「(T23×T24)」	初期生育、登熟良
ピリカスイート*	十生 7号	とうもろこし 北海道 第13号	1975		十 勝 農 試	「V574」×「Me 21547」	早生、缶詰加工用
北 笛 3 号	HLC 145	とうもろこし 北海道 第14号	1976		北海製缶 (十勝農試)	「Me123」×「Ma 21547」	早生、穂型良、軸付冷凍用
ワセホマレ*	道交S1号	とうもろこし 北海道 第15号	1978		十 勝 農 試	「N19×To15」× 「CM37×CMV3」	早生、初期生育良、強稈
W 5 7 3	W 573	36	1971		米 国 (中央農試)		晩生、デント、強稈
P 3 6 2 0	P 3620	37	1971	1975	米 国 (中央農試)		晩生、強稈
エローデントコ ーン	本第1951号	38	1971 (1923)		北海道 農事試		晩生、デント
マンモスホワイト デントコーン	本第2520号	39	1971 (1923)		北海道 農事試		極晩生、デント、未成熟
J X 1 8 8		154	1976		米 国 (北海道農試)		晩生、耐倒伏性
C 5 3 5		155	1976		オ ラ ン ダ (北海道農試)		早生
P 3 3 9 0		156	1976		米 国 (北海道農試)		晩生、耐倒伏性
P 3 5 7 5		157	1976		”		晩生、耐倒伏性

8 大 豆

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
吉 岡 大 粒	本第2065号	大豆 北海道 第1号	1971 (1914)		北海道 農事試	品種比較	枝豆用、食味佳良、扁球、大 粒、黄緑色粒、脐黒色
中 生 光 黒	十支 第 963号	大豆 北海道 第2号	1971 (1933)		十 勝 支 場	品種比較	中生種の晩、煮豆用、食味佳 良、淡褐毛、白花、大粒、黒 色粒、多収

初期生育	分けつ の多少	根の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の稀別	粒色	粗糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
や不	無	中	中	中	D	黄	—	—	早生、道東道北の「坂下」に 代る子実用デント
良	多	中	弱	中	F	橙黄	—	—	道東、道北部における子実用 として「坂下」におきかえる
中	微	中	強	高	F、D	橙黄			道央以南子実用、道東北サイ レーズ用
中	無	長	弱	高	D	黄			全道の「エローデントコーン」 におきかえる
良	無	長	弱	高	D	黄			十勝、網走サイレーズ用
中	微	短	強	中	F、D	黄			十勝、網走、上川北部、サイ レーズ用
良	多	中	弱	や高	F	黄褐			十勝、網走、釧路、サイレー ズ用
中	少	極短	弱	低	S	黄	無	無	全道
中	中	極短	弱	低	S	黄	無	無	全道
良	微	短	強	や低	F、D	黄			道東北、サイレーズ用
や不	無	や長	や強	や高	D	黄			道央・十勝、サイレーズ用
や不	無	長	や強	中	D	黄			十勝、サイレーズ用
—	微	長	中	高	D	黄			北部、東部の冷涼地を除く道 内一円
—	無	長	弱	高	D	白			道央以南
や不	無	長	や強	高	D	黄			道南、サイレーズ用
中	無	短	中	中	F、D	黄			十勝・網走・根釧内陸、サイ レーズ用
や不	無	長	や強	高	D	黄			道南、サイレーズ用
や不	無	長	や強	高	D	黄			道南、サイレーズ用

子葉 の色	幼葉 の色	草姿	葉形	毛茸		花色	熟葉色	粒の				栽培適地
				有無	色			形	大小	色	脐部の色	
黄	紫	直立	円葉	有	褐	赤紫	褐	扁球	大	黄緑	黒	子実用としては気候寒冷な地 方に適し、枝豆用としては全 道各地の栽培に適する
黄	緑	や開張	円葉	有	淡褐	白	褐	扁球	大	黒 光沢強	黒	根室、釧路、宗谷支庁等の寒 冷地を除き、全道各地の栽培 に適する

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
白 鶴 の 子	源支 第1939号	大豆 北海道 第3号	1971 (1934)		渡島支場	「鶴の子」在来種から純系分離	長稈、極晩生、白目極大粒の良質品種
奥 原 1 号	十育 51号	大豆 北海道 第4号	1971 (1940)		十勝支場	純系分離	早生種、耐冷性強、マメシンクイガ被害多、褐毛、赤紫花、黄白色中粒
早 生 緑	北支 第4014号	大豆 北海道 第5号	1971 (1954)		北見支場	在来種から系統選抜	早生種の晩、枝豆用、食味佳良、白花、着莢密、淡黄緑色大粒、精黒色
坂 本 早 生	大野 在来-B	大豆 北海道 第6号	1971 (1954)		渡島支場	在来種(大野村、坂本重太郎氏栽培)	極早生、極短稈の鞍掛け(淡緑色地に黒色斑)種で、食味良好な枝豆用品種
北 見 白	系 50-A	大豆 北海道 第7号	1971 (1956)		北見支場		中生種、耐冷性強、強茎、多収、褐毛、赤紫花、黄白色中粒、精暗褐色
イ ス ズ	系 83-B	大豆 北海道 第8号	1971 (1957)		北見支場		中生種の早、耐冷性強、強茎、長茎、褐毛、赤紫色、やや黄白粒
ホッカイハダカ*	十育 77号	大豆 北海道 第9号	1971 (1958)	1975	十勝支場	「十勝長葉」×「中生種」	中生種、黄色、小粒、マメシンクイガ被害少、良質
カ リ カ チ*	十育 87号	大豆 北海道 第10号	1971 (1959)	1975	十勝支場	「十勝長葉」×「上春別在来」	中生種、黄色、中粒、耐冷性強
コガネジロ*	十育 95号	大豆 北海道 第11号	1971 (1961)		十勝支場	「紫花4号」×「十勝長葉」	晩生種の早、強茎、多収、半無限型、長葉、白毛、黄色小粒、精黄色
アサミドリ	大抽振-1	大豆 北海道 第12号	1971 (1962)		十勝支場	品種比較	中生種、枝豆用、多収、長茎、赤紫花、褐毛、淡黄緑大粒、精黒色
ワセコガネ*	十育 97号	大豆 北海道 第13号	1971 (1964)		十勝農試	「紫花4号」×「十勝長葉」	早生種の晩、機械化栽培向、強茎、半無限型、主茎型、密植適応性大
オシマシロノ*	凡育 12号	大豆 北海道 第14号	1971 (1964)	1975	北海道農試	「十勝長葉」×「黄宝珠」	長茎(無限伸育型)で円葉の極晩生種、白目中粒の良質多収品種
ホウライイ*	十育 109号	大豆 北海道 第15号	1971 (1965)	1978	十勝農試	「下田不知1号」×「十育71号」	晩生種、ダイズシストセンチュウ抵抗性、長茎、分枝数多、白目中粒
トヨスズ*	十育 118号	大豆 北海道 第16号	1971 (1966)		十勝農試	「下田不知1号」×「十支第7910号」	中生種の晩、ダイズシストセンチュウ抵抗性強、短強茎、白目大粒、良質
キタムスノ*	十育 122号	大豆 北海道 第17号	1971 (1968)		十勝農試	「カリカチ」×「北見白」	中生種、耐冷性強、多収、中茎、褐毛、赤紫色、黄白色中粒、精暗褐色
ユウヅル*	中育 3号	大豆 北海道 第18号	1971		中央農試	「鶴の子」在来種から系統分離	やや長茎で円葉の晩生種、白目極大粒(鶴の子種)の良質多収品種
白 千 石	十育 63号	大豆 北海道青刈第19号	1971 (1954)	1975	十勝支場	「裸大豆」×「早生黒千石」	晩生種、黄色、小粒、青刈用
茶 小 粒	本第2429号	大豆 北海道青刈第20号	1971 (1926)		北海道農事試	品種比較	極晩生種、緑肥および青刈飼料用、茎葉の繁茂旺盛で生草収量多い
ヒノユタカ*	十育 161号	大豆 北海道 第21号	1976		十勝農試	「十育129号」×「カリカチ」	中生種、中茎、枯上の良、赤紫花、白毛、黄白色大粒、白目、多収
キタコマチ*	十育 167号	大豆 北海道 第22号	1978		十勝農試	「十育129号」×「トヨスズ」	早生種、短強茎、分枝数少、莢莢は「トヨスズ」に類似、白目中粒

子葉 の色	幼葉 の色	草姿	葉形	毛 茸		花色	熟葉色	粒 の				栽 培 適 地
				有無	色			形	大小	色	脂肪 部の色	
黄	緑	有限	円葉	有	白	白	淡褐	扁球	極大	黄白	濃黄	道南(渡島、松山)に適する限 定優良品種
黄	紫	や 開張	円葉	有	褐	赤紫	暗褐	球	中	黄白	暗褐	道東部および北部の初霜が早 く、生育期間の短い地帯の栽 培に適する
黄	緑	開張	円葉	有	褐	白	褐	扁球	大	淡黄緑	黒	道北、道東における子実用と して「青島大粒」に比べて安 全に収穫ができる。枝豆用と しては全道各地に適する
黄	紫	有限	円	有	褐	赤紫	淡褐	扁楕円 球	中	淡緑地に 黒のクラ カケ斑	黒	早生種であるため適地の範囲 は広いが、都市近郊あるいは 道南地方の蔬菜地帯に栽培する
黄	紫	開張	円葉	有	褐	赤紫	褐	球	中	黄白	暗褐	上川の北部、十勝、網走支庁 管内等の道東、道北地帯およ び道央の山麓地帯
黄	紫	直立	長葉	有	褐	赤紫	褐	球	小	や黄	褐	道東、道北地帯の冷害に遭遇 しやすい地方、および降霜の 早い地方、道央の山麓地帯で 前者に類似の地帯
黄	紫	直	長楕円	無	—	紫	褐	球	小	黄	黒褐	十勝内陸地帯
黄	紫	直	楕円	有	褐	紫	褐	球	中	黄	黒褐	道南および極端な冷涼地を除 いた全道一円
黄	紫	直立	長葉	有	白	赤紫	淡褐	球	小	黄 光沢強	黄	「北見白」の栽培されている十 勝、上川南部の中晩生種地帯
黄	紫	や開張	円葉	有	褐	赤紫	褐	扁球	大	淡黄緑	黒	子実用は道東地帯。枝豆用は 全道各地
黄	紫	直立	円葉	有	白	赤紫	淡褐	球	小	黄 光沢強	黄	十勝の山麓、沿海、網走のオ ホーツク沿海とそれに類似の 早生種地帯
黄	緑	無限伸 育型	円	有	白	白	淡褐	球	中	黄	黄	道央部以南(石狩南部、後志、 渡島、松山)
黄	紫	開張	円葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	中	黄白	黄	全道のシストセンチュウの被害 が認められる中晩生種地帯
黄	紫	直立	円葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	大	黄白	黄	十勝、網走のダイズシストセ ンチュウの被害地域、とくに 中央部で倒伏する地帯
黄	紫	や開張	円葉	有	褐	赤紫	褐	球	中	黄白	暗褐	十勝、上川および網走中央部
黄	緑	有限伸 育型	円	有	白	白	褐	や扁球	極大	黄白	濃黄	石狩、空知の中南部、後志南 西部、胆振、日高、渡島、松 山の各地
黄	紫	直	小楕円	有	褐	紫	褐	球	小	黄	褐	十勝地方および類似の地帯の 青利用
黄	紫	開張	円葉	有	褐	赤紫	黒褐	扁球	極小	褐	褐	緑肥および青刈飼料用としては 全道各地の栽培に適する。採種 栽培は道南地方に限定される
黄	紫	や開張	円葉	有	白	赤紫	淡褐	球	大	黄白	黄	十勝、網走、上川中南部とこ れに類似の地帯、十勝中央部 は除く
黄	紫	直立	円葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	中	黄白	黄	上川および収穫、乾燥時の天 候がこれに類似する地帯

9 小 豆

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
早 生 大 納 言	本第 98号	小豆 北海道 第 1 号	1971 (1914)	1975	不明	品種比較	晩生種、熟莢は淡褐色、子実 は暗赤色、粒形はやや不整で あるが大粒
茶 殺 早 生	本第2336号	小豆 北海道 第 2 号	1971 (1914)		不明(十勝 地方の在来種)	在来種品種比較	極早生種、草丈低く、葉は円 形、熟莢は褐色、子実は赤色 で小粒である
早 生 大 粒 1 号	十育 5 号	小豆 北海道 第 3 号	1971 (1930)		十 勝 支 場	純系淘汰法(「早生大 粒」より)	中生種、草丈中位で葉は円形、 熟莢は灰白色、子実は大粒で 濃赤色
円 葉 1 号	十育 42号	小豆 北海道 第 4 号	1971 (1937)		十 勝 支 場	「円葉」の純系淘汰法	中生種、熟莢は黒褐色、子実 は赤色、中粒、品質良好
宝 小 豆	小豆 W45	小豆 北海道 第 5 号	1971 (1959)		十 勝 支 場	保存品種の比較試 験により選出	中生種、草丈は中位で葉は円 形、熟莢は褐色、子実は赤色 で小粒
光 小 豆	十育 7 号	小豆 北海道 第 6 号	1971 (1964)	1975	十 勝 農 試	「茶殺早生」× 「早生大粒 1 号」	中生種、草丈はやや高く葉は 円形、熟莢は淡褐色、子実小 粒でやや淡赤色
晩 大 納 言	十育 62号	小豆 北海道 第 7 号	1971 (1970)		十 勝 農 試	「能登小豆」× 「早生大粒 1 号」	熟期は中生の晩、草丈やや高 く葉は円形、熟莢は灰白色で 子実は大粒
丹 小 豆	中育 1 号	小豆 北海道 第 8 号	1971		中 央 農 試	「能登小豆」× 「早生大粒 1 号」	中生種、草丈やや高く分枝は 少く、葉はやや鋭、子実は中 粒で赤色
榮 小 豆	十育 70号	小豆 北海道 第 9 号	1973		十 勝 農 試	「3407」× 「早生大粒 1 号」	中生種、草丈は高く草勢は強 く、葉は円形、熟莢は褐色、子 実は小粒で赤色
アカネ ダイナゴン*	十育 69号	小豆 北海道 第10号	1974		十 勝 農 試	「能登小豆」× 「早生大粒 1 号」	中生種、草丈は中位、葉は円 形、熟莢は灰白、子実大粒で 濃赤色
ハヤテショウズ*	十育 85号	小豆 北海道 第11号	1976		十 勝 農 試	「宝小豆」× 「斑小粒系-1」	早生種、草丈やや低く葉は円 形、熟莢は褐色、子実はやや 濃赤で小粒

10 菜 豆

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
金 時	本第2850号	菜豆 北海道 第 1 号	1971 (1905)		北海道 農事試	品種比較	中生の早、矮性、軟莢種、良質
大 福	本第6599号	菜豆 北海道 第 2 号	1971 (1905)		北海道 農事試	品種比較	晩生のつる性硬莢種、高級菜 豆として食味が良く多収、子 実の色は白
大 手 亡	十支 第 455号	菜豆 北海道 第 3 号	1971 (1927)		十 勝 支 場	品種比較	中生、半蔓性、硬莢種、子実 は白色小粒、播種期の早晩に よる収量影響少ない
丸 長 鶏	本第 11840号	菜豆 北海道 第 4 号	1971 (1939)		北海道 農事試	品種比較	開花始は 7 月中旬、成熟期は 9 月上旬で長鶏類中最も早い 極早生種
虎 豆	本第 11304号	菜豆 北海道 第 5 号	1971 (1939)		北海道 農事試	品種比較	晩生のつる性半硬莢種、良質 で菜豆品種中最も食味が良い
大 正 金 時	十支 第8390号	菜豆 北海道 第 6 号	1971 (1957)		十 勝 支 場	純系分離	開花始は 7 月中旬、成熟期は 9 月上旬～中旬で早生の矮性 硬莢種
大 正 白 金 時	十支 第9007号	菜豆 北海道 第 7 号	1971 (1960)		十 勝 支 場	純系分離	開花始は 7 月中旬、成熟期は 9 月上旬の早生矮性硬莢種で、 炭そ病に強い
改 良 大 手 亡	十支第8348号 大手亡(清水)	菜豆 北海道 第 8 号	1971 (1961)	1975	十 勝 支 場	品種選抜	開花始は 7 月下旬、成熟期は 9 月下旬の半蔓性硬莢の晩生種
改 良 中 長	十支第9010号 中長鶏	菜豆 北海道 第 9 号	1971 (1961)	1975	十 勝 支 場	純系分離	開花始は 7 月下旬、成熟期は 9 月上旬の中生の早に属する 半蔓性硬莢種

子葉の 色	莖色	葉形	毛茸の 形	花色	熟葉の		粒の			栽培適地
					形	色	形	大小	色	
	緑	円葉	鋭	黄	太く長い	淡褐	短円筒	大	暗赤	南部温暖地帯
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太 や湾曲	褐	円筒	や小	赤	道東、道北などにおいて、極早 生種を必要とする地帯に適する
緑	緑	円葉	鈍	黄	短、太、 や湾曲	灰白色	烏帽子形	大	濃赤	本道中央部以北および以東に適 する
	緑	円葉	鋭	黄	長太	黒褐	円筒	中	赤	道中央部
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太 や湾曲	褐	円筒	小	赤	道東、道北および道中央部に適 する
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太 や湾曲	淡褐	や烏帽子 型	や小	や淡赤	全道一円、特に冷涼な地帯は除 く
緑	緑	円葉	鈍	黄	短、太、 や湾曲	灰白	烏帽子型	大	濃赤	道央、道南部
緑	緑	円葉・葉 縁くびれ	鈍	黄	長、や太、 や湾曲	褐	円筒形	中	赤	道央、道東北
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太、 や湾曲	褐	円筒形	小	赤	十勝、上川の中南部、冷涼な地 帯はさける
緑	緑	円葉	鈍	黄	短、太、 や湾曲	灰白	烏帽子型	大	濃赤	十勝中央部、上川中南部、道央、 道南
緑	緑	円葉	鈍	黄	や細、長、 先端や湾曲	褐	短円筒形	や小	や濃赤	

草性	幼莖の 色	花色	葉色		葉の 硬軟	粒の			栽培適地
			若葉	熟葉		形	大小	色	
矮性	淡赤紫	淡紅	淡緑	淡黄	軟	楕円	中	赤紫	根室、釧路、宗谷等の寒冷地帯 を除く全道、葉煮食用としては 全道
つる性	緑	白	淡緑、まれに 淡紅飛沫斑	淡褐	硬葉	扁平じん強 形	大	白	本道中部の温暖地帯および南部 の地帯
半蔓性	緑	白	暗緑、成熟 前に暗紫色	淡黄褐	硬	短楕円筋部 がやや突起 する	小	白	寒冷地を除く全道一円
矮性	淡緑	淡紅	淡緑地に鮮 紅色の条斑	淡黄褐地に 斑紋の痕跡	硬	や扁平な長 楕円	中	淡肉色地に赤 紫色の斑紋	全道に適するが、特に北部の極 冷涼な地帯
つる性	淡緑	微紅色を帯 びた白色	淡緑	淡黄白	半硬葉	や長い球	大	白色地に筋部 周囲のみ黄褐 色の紫赤斑	本道中部の温暖な地帯および南 部地帯
矮性	淡赤紫	淡赤紫	淡緑、成熟 前に淡紅色 の斑紋	淡黄白	硬	楕円	や大	淡赤紫	特に寒冷な地帯を除く全道
矮性	緑	白	淡緑	淡黄白	硬	や長楕円	や大	白に極く淡い 鉛色細斑	特に寒冷な地帯を除く全道
半蔓性	緑	白	淡緑、成熟 前に暗紫色 となる	淡黄褐	硬	短楕円	小	白	上川、空知の菜豆栽培地帯およ び十勝、網走の山麓を除く畑作 地帯
半蔓性	淡緑	紅	淡緑地に紫 赤色の斑紋	淡褐地に斑 紋の痕跡	硬	短円筒	中	淡褐地に紫赤 色の斑紋	特に冷涼な地帯を除く全道

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
新 金 時	十育B-1号	菜豆 北海道 第10号	1971 (1964)	1975	十勝農試	「紅金時」× 「大正金時」	開花始は7月上旬、成熟期は 9月上旬の早生矮性良質多収 品種
昭 和 金 時	十育 B-11号	菜豆 北海道 第11号	1971 (1966)	1978	十勝農試	「紅金時」× 「大正金時」	開花始は7月中旬、成熟期は 9月中旬で矮性硬莢の中生種
北 原 紅 長	十支 第9839号 紅長2号	菜豆 北海道 第12号	1971 (1966)	1975		交雑育種	開花始は7月中旬、成熟期は 9月上旬の早生、矮性硬莢種
大 正 大 手 亡	十支 第514号 大正大手亡	菜豆 北海道 第13号	1971 (1969)	1975	十勝農試	品種選抜	開花始は7月下旬、成熟は9 月中旬の半変性硬莢の中生種
十 勝 白 金 時	十育 E-6号	菜豆 北海道 第14号	1971 (1970)	1978	十勝農試	「大正白金時」× 「白丸熟」	開花始は7月中旬、成熟期は 9月中旬の半変性硬莢の中生種
銀 手 亡	十育 A-22号	菜豆 北海道 第15号	1971		十勝農試	「大手亡(網走)」× 「大手亡(清水)」	開花始7月下旬、成熟期9月 中旬の半変性硬莢の中生種
福 粒 中 長	十育 D-7号	菜豆 北海道 第16号	1972		十勝農試	「大正金時」× 「改良中長」	開花始7月中旬、成熟期9月 中旬の半変性の中生種
福 白 金 時	十育 E-10号	菜豆 北海道 第17号	1973		十勝農試	「十育B-11号」× 「5823-C-B-4」	開花始7月中旬、成熟期9月 中旬の早生矮性硬莢種
姫 手 亡	十育 A-29号	菜豆 北海道 第18号	1976		十勝農試	「十育A-29号」× 「Improved White Navy」	開花始7月下旬、成熟期9月 中旬の費性硬莢の中生種
改 良 虎 豆	中育T11号	菜豆 北海道 第19号	1977		中央農試	虎豆在米種(洞爺 村産)より純系分 離	晩生、つる性、半硬莢種「虎 豆」より着莢数多く多収、食 味良好

11 花 豆

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
大 白 花	中育M5号	花豆 北海道 第1号	1976		中央農試	白花豆(壮瞥町産) より系統分離	晩生をつる性花豆、子実は白 色で極めて大きく、多収で良質

12 えん豆

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
改 良 青 手 無	札幌青手無 1号-40	えん豆 北海道 第1号	1971 (1958)		十勝支場	純系分離	緑色大粒、良質、多収、半変 性、晩生
小 緑	十育 14号	えん豆 北海道 第2号	1971 (1965)		十勝農試	「アラスカ」× 「グリーンピース」	緑色小粒、良質、多収、矮性、 晩生、節詰用
大 緑	北育 37号	えん豆 北海道 第3号	1975		北見農試	「十育11号」× 「6202(F ₁)」	緑色大粒、良質、多収、半変 性、晩生
北 海 赤 花	北育 B-2号	えん豆 北海道 第4号	1978		北見農試	「十育16号」×在 米種赤えんどう (中札内)	褐色中粒、多収、矮性、晩生

草 性	幼 茎 の 色	花 色	英 色		英 の 硬 軟	粒 の			栽 培 適 地
			若 英	熟 英		形	大 小	色	
矮性	極淡 赤紫	淡紅	緑	黄白	硬	や長楕円	や大	紅	特に冷涼な地帯を除く全道
矮性	淡赤紫	淡紅	緑	黄白	硬	長楕円	や大	や暗紅	十勝、網走の中央部および上川 の無霜期間のやや長い地帯
矮性	淡赤紫	淡紅	や濃緑	黄白	硬	腎臓	や大	淡赤紫	特に冷涼な地帯を除く全道
半変性	緑	白	淡緑、成熟 前に暗紫色 となる	淡黄褐	硬	短楕円	小	白	十勝、網走などの道東畑作地帯
半変性	緑	白	淡緑	淡黄白	硬	や長楕円	や大	白に極く淡い 銛色網斑	十勝、網走、上川の無霜期間の やや長い地帯
半変性	緑	白	淡緑	淡黄褐	硬	楕円	小	白	十勝、網走、上川などの畑作地 帯
半変性	淡緑	紅	淡緑地に紫 赤色斑紋	淡黄褐地に 斑紋の痕跡	硬	や長楕円	や大	淡褐地に紫赤 色斑紋	特に冷涼な地帯を除く全道
矮性	緑	白	淡緑	淡黄白	硬	や長楕円	や小	白に極く淡い 銛色斑紋	十勝、網走、上川などの菜豆栽 培地帯
叢性	緑	白	淡緑、成熟 前に暗紫色 となる	淡黄褐	硬	楕円	小	白	十勝、上川、網走などの畑作地 帯
つる性	淡緑								

草 性	幼 茎 の 色	花 色	英 色		英 の 硬 軟	粒 の			栽 培 適 地
			若 英	熟 英		形	大 小	色	
つる性	緑	白	緑	褐	硬	腎臓形	大	白	胆振地方を中心とした道央部お よび北見周辺の畑作地帯

草 性	子葉の色	葉 色	花 色	英 色		英の硬軟	粒 の			栽 培 適 地
				若 英	熟 英		形	大 小	色	
半変性	淡緑	や淡緑	白	淡緑	微褐	硬	扁平球形で 大皺あり	大	淡緑	全道一円
矮性	淡緑	濃緑	白	緑	微褐	硬	球	小	緑	全道の青えん豆栽培地帯
半変性	緑	緑	白	淡緑	微褐	硬	扁平球で大 皺あり	大	緑	網走、上川の青えん豆栽培地帯
矮性	淡黄	淡緑	紫赤	緑	淡褐	硬	扁球で大皺 あり	中	帯緑褐地に 赤褐斑	全道の畑作地帯

13 ばれいしょ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
男 爵 薯		ばれいしょ 北海道輪第1号	1971 (1928)		米 国	「Early Rose」の 芽条変異?	早生種。粒ぞろいよく、いも 着は密。食味良、各種調理に 使用可能
ノークイン		ばれいしょ 北海道輪第2号	1971 (1928)		イギリス	不明	中生種。いもは長卵形で肉色 は黄、越冬後甘味を増す、生 食用
紅 丸	本育 309号	ばれいしょ 北海道 第3号	1971 (1938)		北海道 農事試	「Lembke Frühe Rosen」×「ペポー」	晩生種。極く多収、いも着密。 皮色紅、いも偏卵形、でんぷ ん原料用
ばれいしょ 農 林 1 号	島系 12号	ばれいしょ 北海道 第4号	1971 (1943)		北海道 農事試	「男爵薯」× 「Deodara」	中晩生種。多収、食味やや良。 食用及びでんぷん原料用
ニ セ コ	北海 15号	ばれいしょ 北海道 第5号	1971 (1959)	1975	北海道農試	「農林1号」× 「ミラビリス」	晩生種。いもは鮮紅色、でん 粉価は高いが湿腐病に弱い
ユ キ ジ ロ	北海 30号	ばれいしょ 北海道 第6号	1971 (1961)		北海道農試	「ケネベック」× 「農林2号」	中晩生種。疫病に強く多収。 調理後黒変少ない
エ ニ ワ	北海 22号	ばれいしょ 北海道 第7号	1971 (1961)		北海道農試	「島系267号」× 「島系232号」	中晩生種で疫病に強い、多収 で、でん粉価が高い
ホッカイアカ	北海 41号	ばれいしょ 北海道 第8号	1971 (1965)		北海道農試	「2070 ab(31)」× 「島系290号」	晩生種で、疫病に強く、でん 粉価が高い、いもは赤かつ色 で紡錘形
シ レ ト コ	根育 3号	ばれいしょ 北海道 第9号	1971 (1967)		根 飼 農 試	「北海24号」× 「島系291号」	「ホッカイアカ」程度の極晩 生種。疫病に強く極多収
ビ ホ ロ	北海 45号	ばれいしょ 北海道 第10号	1971 (1969)		北海道農試	「北海29号」× 「Hochprozentige」	極晩生種で、でん粉価が高い。 いもは小さい、疫病には強い
タ ル マ エ	北海 47号	ばれいしょ 北海道 第11号	1971 (1969)		北海道農試	「オオジロ」× 「Hochprozentige」	中晩生種で、でん粉価がやや 高い、いもは偏長卵、軟腐病 に弱い
ワ セ シ ロ	根育 11号	ばれいしょ 北海道 第12号	1974		根 飼 農 試	「根系7号」× 「北海39号」	早生種。熟期の遅くに多収。 「男爵いも」より大粒で、皮 色が白い
ト ヨ シ ロ	北海 48号	ばれいしょ 北海道 第13号	1976		北海道農試	「北海19号」× 「エニワ」	中早生種。還元糖含有率低く、 油加工に適する
ツ ニ カ	Tunika	ばれいしょ 北海道輪第14号	1978		ド イ ツ 民主共和国	「Lü56-186/21N」 ×「Lü51-183/2」	中晩生種。ジャガイモシスト センチュウ寄生型Aに対し抵 抗性がある。

II 特 用 作 物

14 て ん 菜

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
つきさっぼ	E 6	てんさい 北海道 第 1 号	1971 (1964)	1975	てん菜研究所	集 団 育 種 法	晩生、極多収。褐斑病抵抗性 強
オポリラーベ	Polyrave	てんさい 北海道輪 第 2 号	1971 (1964)		オランダ	一代雑種育種法	多収。褐斑病抵抗性が極めて 弱い
カーベエルト	KW-E	てんさい 北海道輪 第 3 号	1971 (1964)		西ドイツ	集 団 育 種 法	多収。褐斑病抵抗性が弱い
エージェポリー	AJ Poly-1	てんさい 北海道輪 第 4 号	1971 (1964)	1978	ポーランド	一代雑種育種法	適地では「導入2号」より多 収。高糖性
オカーベポリ	KW-Polybeta	てんさい 北海道輪 第 5 号	1971 (1964)		西ドイツ	"	多収。やや高糖性。褐斑病抵 抗性が弱い

草 姿	茎 色	葉 色	花 色	い も の						疫 病 耐病性	栽 培 適 地
				形	色	表皮の 粗 滑	目 多 の 少	目 深 の 浅	肉 色		
直	緑地に淡赤 色が分布	濃	淡赤紫 先白	球	黄白	滑	中	深	白	弱 r.	全道一円
中	濃緑地に淡 紫色が分布	や濃	紫（白のし ぼりで先白 い）	長卵円形	黄白～ 淡黄褐	滑	少	浅	黄	弱 r.	全道一円
中	緑地に赤色 が分布	中	白	だ円～偏 卵	紅	滑～中	中	や浅	白（紅色を 分布すること がある）	弱 r.	全道一円
直	緑地に淡赤 色が分布	濃～ や濃	白	偏円～偏 球	黄白	滑	中	中	白	弱 r.	全道一円
	緑地に淡赤	や濃	濃淡紫 先白	扁卵	濃紅	滑	少	浅	白	弱	後志、宗谷管内および類 似地帯のてん粉原料用
や開	緑地に淡赤	緑	淡紫	卵	黄	滑	少	浅	白	や強 R ₁	全道、排水のよい肥沃 地
や直	緑	や濃	白	偏円	淡褐	粗・全 面ネット状	中	や浅	白	や強 R ₁	全道、排水のよい肥沃 地
開	淡赤紫	濃	淡赤紫	長紡錘	赤褐	や滑	多	浅	淡黄	強 R ₂ R ₄	全道、てん粉原料用
直	緑地に赤紫	や淡	白	卵	淡黄白	滑	中	や浅	白	強 R ₁ R ₂	全道、とくに道東、道 北および後志
中	緑地に一部 赤紫	や濃	淡青	偏球	淡褐	粗	中	中	白	強 r.	天北、上川北部、網走、 十勝などのてん粉原料 地帯
中	緑	緑	淡紫	偏長卵	淡褐	中	中	中	白	や弱 ～中r.	全道、てん粉原料地帯
や開	緑、一部淡 紫	淡	紫	偏卵～偏 球	淡黄白	滑	中	中	白	や強 R ₁	全道、食用
や開	緑	中	白	偏球～偏 卵	淡黄褐	中	中	浅	白	R ₁	全道
や開	緑	や淡	白	球～偏球	黄褐	粗	中	や深	黄		道央のジャガイモシス トセンチュウ発生地帯

倍数性	胚数性	葉姿	根形	露肩の多少	分岐根の多少	褐斑病耐病性	栽 培 適 地
2倍体	多	直立	長円錐	や多	や多	強	道南部、中央部およびその他の褐斑病多病地域
倍数体	〃	中間	短円錐	少	少	弱	網走、十勝地方の褐斑病発生の少ない地帯、こ れに準ずる地帯
2倍体	〃	〃	〃	〃	〃	〃	根釧、十勝、網走の褐斑病発生の少ない地帯
倍数体	〃	〃	〃	や多	〃	や弱	網走地方の紋別、遠軽地区およびこれに準ずる 地区
〃	〃	開平	〃	〃	〃	弱	根釧、十勝、網走の褐斑病発生の少ない地帯、 これに準ずる地帯

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
台 糖 1 号	台 糖 1 号	てんさい 北 海 道 第 6 号	1971 (1965)	1975	台糖	集 団 育 種 法	褐斑病抵抗性が強く、高収性である。
台 糖 2 号	台 糖 2 号	てんさい 北 海 道 第 7 号	1971 (1965)	1975	"	"	
台 糖 3 号	台 糖 3 号	てんさい 北 海 道 第 8 号	1971 (1965)	1975	"	"	
○てんけん1号*	T 1002	てんさい 北 海 道 合 第 9 号	1971 (1968)	1978	てん菜研究所	合 成 品 種 育 法	初期生育良好、多収、褐斑病抵抗性強
キタマサリ	支 7 号	てんさい 北 海 道 第 10 号	1971		"	"	早生、極多収
○ソローラベ	Solorave	てんさい 北 海 道 輪 第 11 号	1971		オランダ	一 代 雑 種 育 種 法	収量、糖分が多胚の「Plyrave」と同程度の単胚品種
○カーベノガモノ	Kareme-gamaro	てんさい 北 海 道 輪 第 12 号	1972		西ドイツ	"	倍数体の単胚品種、根重はや多収型
○モノヒル	Monohill	てんさい 北 海 道 輪 第 13 号	1973		スウェーデン	"	単胚品種で褐斑病抵抗性は弱いが多収性である
○モノホープ*	T 1013	てんさい 北 海 道 第 14 号	1973		てん菜研究所	"	単胚、多収、良質、褐斑病抵抗性強

注) ○印を付けた品種の特性は「昭和52年度 種苗特性分類調査報告書～てん菜、さとうきび」昭和53年3月、甘味資源振興会、よりとった。したがって、品種決定時(農業試験会議成績書)の記載とやや異なる。その他の品種についても、男沢(十勝農試)が前出「～分類調査報告書」の分類基準によって訂正した形質がある。

15 は っ か

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
は う よ う*	北 交 8 号	はっか 北 海 道 第 1 号	1971 (1965)	1978	北海道農試	種 間 交 雑	中生種に属し、草型は直立型で耐倒伏性が極めて強く、機械化向、高収率、多収品種である
あ や な み*	北 交 12 号	はっか 北 海 道 第 2 号	1971 (1968)		北海道農試	種 間 交 雑	銹病、倒伏、線虫などに強い安定多収型で、機械化集団栽培に適す
わ せ な み*	北系J15号	はっか 北 海 道 第 3 号	1973		北海道農試	種 間 交 雑	早生短棒で耐倒伏、耐病性で高収、油率多収型で連作栽培にも適する
さ や か ぜ*	北系J16号	はっか 北 海 道 第 4 号	1975		北海道農試	倍 数 体 利 用 種 間 交 雑	中生の晩で高脂肪、多収型品種であるが耐倒伏性は中程度

16 除 虫 菊

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
わ っ さ む	26S-6 -1	除虫菊 北 海 道 第 1 号	1971 (1961)		北海道農試	ケニヤ導入種からの 栄養繁殖系統	中生、分枝数が多いため着花数多く多収、ピレトリン含有率もやや高い

倍数性	胚数性	葉姿	根形	露肩の多少	分岐根の多少	褐斑病耐病性	栽 培 適 地
2 倍体	多	直立	長円錐	少	中	強	道南地域の褐斑病が多発する低台地帯
"	"	"	"	"	"	"	道南地域の一般低台地帯
"	"	"	"	"	"	"	道南地域の高台地帯
"	"	"	"	多	"	"	道南、道央およびその他褐斑病多発地帯
"	"	やや開平	短円錐	"	少	弱	根釧、天北地帯およびこれに準ずる地帯
3 倍体	単	"	円錐	"	"	"	道東、道北などの褐斑病少発地帯およびこれに準ずる地帯
倍数体	"	やや直立	短円錐	中	"	"	根釧を除く道東、道北の褐斑病少発地帯、これに準ずる地帯
3 倍体	"	開平	円錐	"	"	"	道東などの褐斑病少発地帯、これに準ずる地帯
"	"	やや開平	"	少	"	やや強	全道一円に適應するが、特に道央および道南における適應性が大きい

和洋種別	花色	茎 の			葉 の						さび病耐病性	耐倒伏性	栽 培 適 地
		形	色	毛茸の多少	形	葉脈の色	葉縁	着生状態	葉柄の長短	葉色			
和種	中	四角柱状	赤紫	無	旋紡錘	明緑	鋸歯	中	短	緑	やや強	強	全道の薄荷栽培地帯
和種	濃	四角柱状	赤紫	少	やや旋紡錘	淡赤紫	鈍鋸歯	垂	短	濃緑	強	強	全道の和種薄荷栽培地帯
和種	濃	四角柱状	淡赤紫	少	皮針		鈍鋸歯	垂	中	淡緑	強	やや強	全道の和種薄荷栽培地帯
和種	濃	四角柱状	赤紫	少	紡錘		鋸歯	垂	短	緑	強	中	全道の和種薄荷栽培地帯

草 姿	毛茸の多少	葉 の		舌 状 花 の				管状花の直径	栽 培 適 地
		形	色	数	長さ	巾	着生密度		
叢生	や多	や広	白緑	や多 24枚	並 17.2mm	やや狭 6mm		並 19mm	全道の除虫菊栽培地帯

注) 「北海1号」対比

17 ラベンダー

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
おかむらさき	遅咲1-4	ラベンダー 北海道第1号	1971 (1964)		中央農試	在来種より系統選抜	中生、花茎極長、花色やや濃紫、花茎収量やや多、収油率中、油質良
よ う て い	早咲1-3	ラベンダー 北海道第2号	1971 (1964)		中央農試	在来種より系統選抜	早生、花茎やや長、花色やや淡紫、花茎収量中、収油率極高、油質良
は な も い わ	中咲2-2	ラベンダー 北海道第3号	1971 (1968)		中央農試	在来種より系統選抜	中生種、花茎長中、花色極淡紫、花茎収量多、収油率定植当初低い

18 な た ね

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
岩 内	本第 11054号	なたね 北海道第1号	1971 (1935)		北海道農試	在来種(岩内郡地方、別名「九葉」)	洋種の秋播晩生種、含油量多く良質、冬損に弱い
ハンブルグ1号	本育 357号	なたね 北海道第2号	1971 (1937)	1975	北海道農試	「ハンブルグ」から純系淘汰	洋種の秋播晩生種、含油量多、冬損に強い
タイセツナタネ*	北系87号	なたね 北海道第3号	1971 (1961)		北海道農試	「ハンブルグ1号」より選出	洋種の秋播晩生種、耐寒耐病性強、良質多収、含油率高い
イワオナタネ*	MR 1号	なたね 北海道第4号	1971 (1961)		北海道農試	「岩内」より選抜	洋種の秋播晩生種、強悍、耐寒耐病性強、多収、含油量多

III 果 樹

19 り ん ご

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
祝	American Summer Pearmain	りんご 北海道輪第1号	1971 (1924)	米国原産	両親不明	中生種としては品質良く、樹体も強健、生理的落果が多い
旭	McIntosh Red	りんご 北海道輪第2号	1971 (1924)	カナダ(オンタリオ州)	偶発実生	結果早く年々豊産であるが、老衰は割合に早く、30年を過ぎると減収傾向
紅 玉	Jonathan	りんご 北海道輪第3号	1971 (1924)	米国(ニューヨーク州)	ツェンブルグの実生	結果年令到達早く豊産、独特の風味で品質がよい
陽 玉 (デリシャス)	Delicious	りんご 北海道輪第4号	1971	米国(アイオワ州)	偶発実生	食味は良いが、着色は良くない。結果年令到達おそく生産力は高くない
黄 冠 (ゴールデン デリシャス)	Golden Delicious	りんご 北海道輪第5号	1971	米国(ウェストバージニア州)	偶発実生	結果年令到達早く豊産性、無袋では果面の锈が多い
印 度		りんご 北海道第6号	1971	青森県	白龍の偶発実生と推定	果汁少なく、甘味強い独特な味、隔年結果性強い
タイズマンレッド	Tydemans Red	りんご 北海道輪第7号	1971 (1966)	英国(イーストモーリング研)	「旭」×「ウォーセスターベアーマン」	早生種としては品質は良い。収穫前の落果がやや多い
早 生 旭	Early McIntosh	127	1973	米国(ニューヨーク農試)	「黄冠」×「旭」	樹勢強健で、早生種としては品質優良隔年結果性が高い
レッドゴールド	Redgold	128	1973	米国(ワシントン州)	「ゴールデンデリシャス」×「リチャードデリシャス」	結果年令到達が早く、豊産性で貯蔵性は劣るが、風味良好である

花 茎 の			花 色	花序の長短	栽 培 適 地
姿	色	硬 軟			
半平伏 先端曲	緑	や硬	や濃紫	中	現在栽培されている各地
や直立	淡緑	や硬	や淡紫	長	現在栽培されている各地
や直立	淡緑	や硬	極淡紫	中	現在栽培されている各地

和洋種の別	春秋の別	草 姿	葉 色	花 色	粒 の		冬枯歩合	栽 培 適 地
					大 小	色		
洋種	秋	Ⅳ型	濃緑	黄	大	黒褐	*21.5	北海道中部以南の気候温暖な地帯に適する
洋種	秋	Ⅳ型	淡緑色	黄	大	黒褐	*24.8	北海道東部、北部の寡雪極寒冷地帯を除く各地に適す
洋種	秋	Ⅳ型	濃緑	黄	大	黒	17.8	冬枯多発地帯、菌核病多発地帯主として道南
洋種	秋	Ⅳ型	濃緑	黄	中	黒	21.8	倒伏し易い地帯、多肥栽培に適し道南の菌核病多発地帯

注) *印は1956～1959年4ヵ年平均

樹 勢	樹 姿	収 量	熟 期	貯蔵性	果 形	果実の大きさ	果皮色	肉質	風 味	栽 培 適 地
強健	や直立性	中	8月下～ 9月上・中	低	長円～楕円形	160～200g	黄緑地に 紅褐の縞	緻密	果汁多く微酸、甘 味に富み、味優	全道一円
頗る強健発 育旺盛	開張、枝 下垂せず	多	9月下	中	円～扁円形	180～220g	緑黄地に 濃紅色	頗る 緻密	最初酸味強いが漸 次甘味増し、味優	全道一円
中	開張しや すい	多	10月中	稍高	円～やや長円	160～230g	満面鮮紅 色	緻密	果汁稍多く、酸味 強いが味優	全道一円
強健、発育 旺盛	結実後開 張	中	10月下	稍高	長円～卵円錐	200～300g	緑黄地に 暗紅の縞	緻密	果汁多く甘味芳香 有、味秀	全道一円
強健、発育 旺盛	半開張	多	10月下	高	長卵～長円形	200～300g	鮮黄色	緻密 極めて良	果汁稍多、甘酸適 和、芳香有、味秀	全道一円
強健	結実後開 張	多	10月下～ 11月上	高	長円で頂部円 錐	200～300g	緑、緑黄 地に淡赤 褐色	緻密 甚だ堅い	果汁非常に少く芳 香強く、酸味なく 甘味強、味良	道央以南
強健	や開張性	中	9月上～ 9月中	低	楕円形	180～200g	全面淡紅 色、陽光 面濃紅色	緻密	果汁多く、芳香有 味優	全道一円
強健	半開張性	中	8月中～ 下	低	扁円(円錐)	160～200g	黄緑地に 褐紅	緻密 で軟	果汁多く、やや酸 多いが味優	全道一円
強健	や開張性	多	10月上～ 中	中	円	200～250g	全面濃紅	粗	果汁多く、甘味強 く、微酸、味優	全道一円

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
陸 奥		129	1973	青森県りんご試	「ゴールデンデリシャス」×「印度」	3 倍体であるため授粉樹に用いられない。隔年結果性やや強い
ふ じ	りんご農林 1 号	130	1973	東 北 農 試	「国光」×「デリシャス」	「デリシャス」に比べ生理的落果少く豊産性、食味良好で貯蔵品種として優
スターキングデリシャス	Staking Delicious	131	1973	米国(ニュージャージー州)	「デリシャス」の枝変わり	果実の外観食味ともに優れるが、結果年令到達おそく、生産力高くない
リチャードデリシャス	Richared Delicious	132	1973	米国(ワシントン州)	「デリシャス」の枝変わり	果実の外観食味ともに優れるが、結果年令到達遅く、生産力高くない

20 りんご台木

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
EMVII	M 7	33	1972	英国(イーストモーリントン研)	在来系統を分類し命名	各樹品種とも接木後の親和性良好で、半わい性となり「マルバ」台の2倍程度密植可。
EMIX	M 9	34	1972	英国(イーストモーリントン研)	在来系統を分類し命名	各樹品種との親和性は良好で、わい性となり「マルバ」台の3～4倍程度の密植可
MM111		35	1972	英国(イーストモーリントン研、ジョン・インクス試)	「ノザンズバイ」×「M793」	各樹品種とも接木後の親和性良好で、「マルバ」台程度の生育をし、樹体強健

21 な し

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
身 不 知		なし 北海道第1号	1972 (1936)	不明	余市地方で実生から発見	晩生種、果実は洋ナシ形、370g 内外、収量は多、品質はやや不良
長 十 郎		なし 北海道第2号	1972 (1924)	神奈川県当麻長十郎	1895年ころ偶然実生として発見	晩生種、果実はやや円形、280g 内外、収量は多、品質は良
バートレット	Bartlett	なし 北海道第3号	1972 (1924)	イギリス原産	不明	中生種、果実は円すい形、250g 内外、収量は多、品質は良。
ブランデーワイン	Brandy-Wine	なし 北海道第4号	1972 (1924)	不明	不明	中生種、果実は短円すい形、180g 内外、収量は中、品質は最良。
日 面 紅	Flemish Beauty	なし 北海道第5号	1972 (1924)	ベルギー原産	不明	中生種、果実は円すい形、300g 内外、収量は多、品質は良。
ウインターネリス	Winter Nelis	なし 北海道第6号	1972 (1924)	イギリス原産	不明	晩生種、果実は短円すい形、150g 内外、収量は中、品質は良。
初 見		なし 北海道第7号	1972 (1957)	北海道農試	「長十郎」×「身不知」	早生種、果実は短紡錘形、180g 内外、収量は多、品質はやや良。
甘 玉		なし 北海道第8号	1972 (1957)	北海道農試	「長十郎」×「身不知」	中生種、果実は円形、250g 内外、収量は中、無袋不可、品質はやや良。
北 洋		なし 北海道第9号	1972 (1957)	北海道農試	「二十世紀」×「長十郎」	晩生種、果実はやや不整な偏円形、250g 内外、収量は多、品質は良。
北 星	北農1号	なし 北海道第10号	1972 (1966)	北海道農試	「身不知」×「二十世紀」	中生種、果実は紡錘形、250g 内外、収量は中程度、品質は良。

樹 勢	樹 姿	収 量	熟 期	貯蔵性	果 形	果実の大きさ	果 皮 色	肉 質	風 味	栽 培 適 地
強健	半開張性	中	10月下	高	長円～円	350～400 g	黄緑～黄	や粗 維	微酸、甘味も有 2月以降味秀	全道一円
強健	開張性	多	10月下～ 11月上	高	円～長円	250～300 g	緑黄又は 黄の地に 暗紅縞	黄白 緻密	果汁多く、微酸、 甘味多く味秀	全道一円
強健旺盛	結実後開 張	中	10月下	や高	長円～卵円錐	200～300 g	満面濃暗 紅	緻密	果汁多く、甘味芳 香有り、味秀	全道一円
極旺盛	結実後開 張	中	10月下	や高	長円～卵円錐	250～300 g	全面鮮紅	緻密	果汁多く甘味芳香 有り、味秀	全道一円

樹の大きさ	樹勢	樹姿	収量	熟期	貯蔵性	果形	果実の大きさ	果皮色	肉質	風味	栽 培 適 地
半わい 性	中	や開張	中	や早ま る	平常	平常	平常	やまさ る	平常	や糖度 上る	現在のりんご産地全道一円
半わい 性	中	開張	少	早まる	や劣る	平常	平常	やまさ る	平常	糖度上 る	現在のりんご産地全道一円
標準	旺盛	平常	多	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	現在のりんご産地全道一円

樹勢	樹姿	収量	収穫期	追熟期 間	貯蔵性	果形	果実の 大きさ	果皮色	肉質	風味	品質	栽 培 適 地
強	開張性	多	10月中 ・下		中	円錐形	370 g 内外	緑黄色	粗	や良	や良	本道独特の品種で耐寒性強く、 本道一円に栽培できるが、品質 的経済的栽培は道央以南の地域
中	直立性	多	10月下		高	や扁円 形	280 g 内外	淡褐色	や粗	良	良	晩生種で耐寒性に弱いことから、 道央南部以南の地域
強	開張性	多	9月上 ・中	7～10 日	短	円錐形	250 g 内外	橙黄色	密軟	良	良	耐寒性は「身不知」より弱い。 道央以南で最低気温が-25～ -26℃以下にならない地域
強	開張性	中	9月下	2週間 前後	短	短円錐 円	180 g 内外	黄緑	密軟	良	最良	耐寒性は「身不知」に近い。 道央以南の地域
強	開張性	多	10月上	2週間 前後	短	円錐形	300 g 内外	黄緑	密軟	良	良	耐寒性は強く「身不知」に近 いか、経済栽培は道央以南の地域
中	や開張 性	中	10月下	2～3 ヶ月	短	短円錐 形	150 g 内外	暗緑色	や粗軟	良	良	耐寒性は強く「身不知」に近 い。道央以南の地域。
強	や開張 性	多	9月中		低	短紡錘 形	180 g 内外	緑褐色	や密	良	良	耐寒性が強く早生種であるこ とから、道央以北の遠品種のな かった地域の自家栽培に適する。
強	開張性	中	9月下 10月上		中	円形	250 g 内外	淡緑黄 色	や粗	良	良	耐寒性の点からみて、胆振以 北の最低気温が-27～-28℃ 以下にならない地域。
強	開張性	多	10月下		高	不整な 偏円形	280 g 内外	淡褐色	密	良	良	空知以南、胆振以北の中部地 方に適する。黒星病の被害少 なく、粗放栽培に耐えるので 道南の一部地方にも適する。
中	開張性	中	9月下		中	紡錘形	約 250 g	緑黄	や粗	良	良	「長十郎」の栽培されている 地域

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
北 都	北 農 2 号	なし 北 海 道 第 11 号	1972 (1966)	北海道農試	「二十世紀」×「身不和」	中生種、果実は短紡錘形、230g 内外収量は中程度、品質は最良

22 ぶ ど う

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
キャンベルス アーリー (カメルスアーリー)	Campbells Early	ぶどう 北 海 道 輪 第 1 号	1972 (1924)	米国(オハイオ州)	「ムーアアーリー」 の実生	黒色種、果房果粒共に大きい。極めて 豊産性である。
デラウェア	Delaware	ぶどう 北 海 道 輪 第 2 号	1972 (1924)	米国(オハイオ州)	偶発実生、1849年 発表	赤色種、果房果粒共に小さい。甘味多 い。耐寒性はやや劣る。
ナイアガラ	Niagara	ぶどう 北 海 道 輪 第 3 号	1972 (1924)	米国(ニュー ヨーク州)	「コンコード」× 「キャサディ」	白色種。豊産性で甘味多いが、熟期遅 い。狐臭強い。
ブライトン	Brighton	ぶどう 北 海 道 輪 第 4 号	1972 (1924)	米国(ニュー ヨーク州)	「ダイアナハン ブルグ」×「コン コード」	赤色種、甘味多く品質は良いが、自家 不受精のため結実不安定。
バッファロー	Buffalo	ぶどう 北 海 道 輪 第 5 号	1972 (1966)	米国(ニュー ヨーク農 試)	「ハーバート」× 「ワトキンス」	黒色種。糖酸共に多く、独特の香りが ある。耐寒性はやや劣る。
ポートランド	Portland	133	1973	米国(ニュー ヨーク農 試)	「チャンピオン」× 「ルテー」	白色種
フレドニア	Fredonia	134	1973	米国(ニュー ヨーク農 試)	「チャンピオン」× 「ルシール」	黒色種。熟期やや早く、酸味やや少な い。脱粒し易い。

23 オウトウ 23

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
日 の 出		その他 北 海 道 第 10 号	1971 (1922)	イギリス原 産	不明、1988年以前 に発表	極早生種、果実は紫黒色でやや小さい。 多汁であるが甘味やや乏しい。
北 光(水門)		その他 北 海 道 第 11 号	1971 (1922)	小樽市で発 見	偶発実生、1912年 (明44)	中生種、果実は中位で軟らかく、多汁 である。裂果が少ない。
ナポレオン		その他 北 海 道 輪 第 12 号	1971 (1922)	欧州在来	不明、1700年以前 に発表	晩生種、果実は大きく肉質はやや硬い。 甘味多く、品質は良い。加工適性有。
佐 藤 錦		135	1973	山形県 佐藤栄助	「ナポレオン」× 「黄玉」	中生種。果実は黄赤色で中位。甘味多 く、品質は良い。

24 ウ メ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
豊 後		その他 北 海 道 第 13 号	1971	不明	不 明	耐寒性が強く、大果で果肉が厚く加工 向きだが梅干に不適、耐病虫性弱。
大 野 豊 後		153	1974	道 南 農 試	大野町の豊後梅の 在来種中より選抜	耐寒性強く、結実期早く、豊産性で果 実も小さく梅干にも向くが、樹勢弱く 樹形維持に難点がある。

樹勢	樹姿	収量	収穫期	貯蔵性	果形	果実の 大きさ	果皮色	肉質	風味	品質	栽 培 適 地
強	開張性	中	9月下	中	短紡錘 形	約 230g	白緑黄	密	良	最良	中生種「身不知」の栽培されている地域

樹勢	収量	熟期	果房形	着粒の 疎密	果粒形	果房の 大きさ	果粒の 大きさ	果皮色	肉質	風味	そ の 他	栽 培 適 地
中	極多	9月下 ～10月上	長円錐	密	円	大	や大	黒	軟	酸や多		道央南部以南
強	中	10月上	円筒	や密	円	小	小	赤褐色	軟	酸味少 甘味多	G A 処理により 種なし化、 熟期促進可	道央南部以南
強	多	10月上 ～中	円錐	密	円	中	中	黄緑	軟	甘味多 酸味強		道央南部以南
強	少	10月上	長円錐	中	円	中	中	暗赤	軟	甘味多	自家不受精	道央南部以南
や強	中	9月下 ～10月上	円錐形	や疎	円	中	中	紫黒	軟	糖酸芳 香		道央南部以南
中	中	9月中 ～下	円筒	中	円	中	中	緑黄	軟	甘味多		道央南部以南
強～中	中	9月下	短円筒	密	扁円	中	中	青黒	軟	酸や少		

樹勢	樹姿	収量	熟期	果形	果実の 大きさ	果皮色	肉色	肉質	風味	品質	裂果	栽 培 適 地
中	直立性	中	6月下	心臓形	中	紫黒	紫赤	軟	甘味中 微酸	中	中	道央以南
強	半開張 性	多	7月上	心臓形	中	赤帯黄	淡黄	軟	甘酸中 位	中	少	道央以南
強	直立性	多	7月中 ～下	長心臓 形	大	赤帯淡 黄	黄白	やや硬	甘味多	上	中	道央以南
強	直立性	多	7月初	短心臓 形	中	黄赤	黄白	軟	甘味多	上	中	道央以南

樹の 大きさ	樹勢	樹姿	収量	自家結 実性	収穫期	貯蔵性	果形	果実の 大きさ	果皮色	風味	そ の 他	栽 培 適 地
大	強	や直立	や多	有	8月上	有	円～長 円	大 (30～ 60g)	黄緑地暗 紅斑暈	中	縫合線不明 不整果多 玉摘不良	道南、道央
小	弱	開張	多	有	8月上		円	小～中	黄緑	良		道央、道南

25 ス モ モ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ビ ュ ー テ イ		136	1973 (1925)	米国	不 明	極早生、豊産なるも小果で食味不良、日焼多、黒斑病弱、貯蔵性劣る。
大 石 早 生		137	1973 (1952)	福島県 大石俊雄氏 園	フォーモサ実生 (含ビューティー)	極早生、豊産なるも、小果で食味不良、日焼少しも黒斑病に弱い。

26 モ モ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
倉 方 早 生		138	1973 (1951)	東京都 倉方英蔵氏 園	「長生種(タスカ ン×白桃)」×「実 生種」	外観美麗、食味多甘、貯蔵性良好なる も肉質や硬で自家結実性乏しい。
白 鳳		139	1973 (1931)	神奈川県農 試	「白桃」×「橘早生」	食味、色沢良好なるも、中果、中産、 弱勢、耐病性弱、等で栽培管理注意。
大 久 保		140	1973 (1925)	岡山県 大久保重五 郎氏園	白桃実生	果実外観優れ、貯蔵輸送性良好なるも、 弱矮開張下垂性と食味淡泊注意。
砂 子 早 生		141	1973 (1958)	岡山県 上村璋男氏 園	偶発実生	大果、外観美麗、食味良好、貯蔵性良 好なるも、自家結実性なし。

27 カーランツ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ロンドン マーケット		142	1973	不明(イギ リスで古く から栽培)	不 明	樹は大きく開張性、ごく豊産、熟期7 月中～下旬、果実は赤く大きい。
ローズオブ ホーランド		143	1973	不明(フラン スで古く から栽培)	不 明	樹は大きく直立性、熟期7月下旬～8 月上旬、ごく豊産、果実の大きさ中 で濃赤色。
レッドレーフ		144	1973	アメリカ (ミネソタ 農試)	不 明	樹の大きさは中、開張性、収量中、熟 期7月中旬、果実は大きく赤い。
ボスクープ ジャイアント		145	1965 (1965)	オランダ	不 明	樹は大きく開張性、収量中位、熟期7 月下旬～8月上旬、果実は黒く大きい。

28 ハイブッシュブルーベリー

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ジ ュ ー ン	June	146	1974	米国	「(ブルックス)× (ラッセル)」×「ル ーベル」	早生種、樹姿はやや開張性で大きく、 収量は多い。凍害に強い。
ランコカス	Rancocas	147	1974	米国	「(ブルックス)× (ラッセル)」×「ル ーベル」	中生種、樹姿はやや開張性で大きく、 収量は多い。凍害に強い。
ウェイマウス	Weymouth	148	1974	米国	「ジューン」×「キ ャボット」	早生種、樹姿は開張性で小さく、収量 は多い。凍害に強い。
ハーバート	Herbert	149	1974	米国	「スタンリー」× (「ジャージー」× 「バイオニヤ」)	中生種、樹姿は開張性で大きく、収量 は多い。凍害にやや強い。

樹の 大き さ	樹勢	樹姿	収量	自家結 実性	熟期	貯蔵 性	果形	果実の 大きさ	果皮色	肉色	肉質	風味	その他	栽 培 適 地
や少	良好	直立～ 開張	極多	有	8月中 ～下	劣	円錐心 臓形	小 (100g)	鮮紅	黄色～ 淡紅	柔軟、 多汁	少甘、 少酸	黒斑病弱 日焼多	道南、道央、道東
や大	強	直立～ 開張	多	不良	8月中 ～下	劣	円錐心 臓形	小 (100g)	鮮紅	黄	柔軟	少甘、 極少酸		道南、道央、道東

樹の大 きさ	樹勢	樹姿	収量	熟期	果形	果実の 大きさ	果皮色	肉色	肉質	核の粘 性	風味	品質	そ の 他	栽 培 適 地
や大	強	や開 張	多	8月下	楕円	中の小 (150g)	果頂紅 暈	白色	緻密	粘核	多甘少 酸良	良好	耐病性強、 核割少、核 周着色	渡島、松山、胆振、 日高(中西部)
や大	中～ や弱	開張	中	9月上 ～中	円～長 円	中 (180g)	乳白色 紅暈	白色	緻密や 硬	半離粘	多甘極 少酸	良好	耐病性や弱 核周淡紅、 剥皮容易	渡島、松山、胆振、 日高(中西部)
中～小	弱	極開 張	多	9月中	円	大 (230g)	乳白鮮 紅斑暈	白色	や粗	離核	甘酸共 や淡白	や良	日焼多、核 周淡紅穿孔 病弱	渡島、松山、胆振、 日高(中西部)
大	や強	開張	多	8月下	楕円～ 円	大 (250g)	乳白色 斑暈	白色	緻密緻 維や少	半離粘	多甘少 酸	良好	耐病性強、 核割少、剥 皮容易	渡島、松山、胆振、 日高(中西部)

樹の大 きさ	樹 勢	樹 姿	収 量	熟 期	果房長	果 形	果実の 大きさ	果皮色	耐寒性	栽 培 適 地
大	強	開長	ごく多	7月中下	や長	円	大	赤	高	全道
大	強	直立	ごく多	7月下～ 8月上	長	円	中	濃赤	高	全道
中	中	開張	中	7月中	や長	円	大	赤	高	全道
大	強	開張	中	7月下～ 8月上	短	円	大	黒	高	全道

樹の大 きさ	樹 勢	樹 姿	収 量	熟 期	果 形	果実の 大きさ	果皮色	風 味	耐凍性	栽 培 適 地
大	中	や開張性	多	7月下～ 8月下	や扁円	中	濃藍	甘味中位	強	道央以南
大	中	や開張性	多	8月上～ 8月末	や扁円	中	濃藍	甘味多	強	道央以南
小	弱	開張性	多	7月下～ 8月中	や扁円	や大	濃藍	甘味多	強	道央以南
大	中	開張性	多	8月中～ 9月中	扁円	大	濃藍	甘味中位	や強	道央以南

29 グースベリー

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ピックスウェル	Pixwell	158	1976	米 国	「リベス・ミズリエンシス」×「オレゴンチャンピオン」	熟期7月下旬，果実は大さき中位で円形，紫紅色，糖度高い，ごく多収。
グレンデール	Glennedale	159	1976	米 国	「グロスラリア・ミズリエンシス」×栽培種の子孫	熟期7月下旬，果実は大さき中位で円形，紫紅色，糖度中位，多収。
オレゴン チャンピオン	Oregon Champion	160	1976	米 国	「クラウン・ボブ」×「ホートン」	熟期7月下旬，果実は大さき中位で円形，緑黄色，糖度高い。
ホ ー ト ン	Houghton	161	1976	米 国	アメリカ種×ヨーロッパ種	熟期7月下旬，果実はやや小さく円形暗赤色，糖度高い，多収。

IV 花 卉

30 花 ユ リ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育 成 方 法	主 要 特 性
ハゴロモ	交配2号	花ユリ 北海道第1号	1971 (1960)	1979	北海道立農試	「あかひらと」×「おくきんぶせん」	開花7月下旬～8月上旬，花色朱紅色，花弁反転，珠芽なく下向咲，切花用。
岩内透3号	146号	花ユリ 北海道第2号	1971 (1964)	1979	北海道立農試	自生「エソスカシユリ」より選抜	開花期6月上・中旬，花色鮮紅色，斑点少くコップ状で上向，促成切花用。
えぞあか	岩宇7号	花ユリ 北海道第3号	1971 (1967)	1979	中央農試	「えぞ透」×「千草」	開花期6月中・下旬，花色赤橙色，斑点少，反転少く上向咲，促成切花用。
えぞこがね	岩宇16号	花ユリ 北海道第4号	1971 (1967)	1979	中央農試	「えぞ透」×「透ゆり」(不明)	開花期6月中・下旬，花色黄橙色，斑点中，上向咲，稍々大輪，促成切花用。
岩内黄金	4503	花ユリ 北海道第5号	1975		中央農試	(3711)×(F系)	開花期6月下旬～7月上旬，花色濃黄色，斑点少く横向咲促成切花用。

V 野 菜

31 トマト

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性						栽 培 適 地
					草勢	熟期	果型	果色	果重	耐病虫性	
あ か ぎ	25	1972	1979	東京レード	強	中	豊円	緋赤	148 g		全道一円
宝 冠 1 号	26	1972		武蔵野種苗	中	早～中	豊円	濃桃	146		〃
新 豊 紀	27	1972	1979	ヤマト種苗	中	早～中	扁円	桃	152		〃
豊 緑	28	1972	1979	サカタ種苗	強	中	扁円	濃桃	162	F	〃
スーパーキング	29	1972	1979	ヤマト種苗	中～強	早～中	扁円	濃桃	177		〃
福 寿 2 号	50	1972 (1930)	1979	タキイ種苗	中	早	豊円	濃桃	157		〃

樹の大きさ	樹 勢	樹 姿	収 量	熟 期	果 形	果実の大きさ	果皮色	品 質	栽 培 適 地
大	強	や開張性	ごく多	7月下	円	中	紫紅	良	全道。土壌適応性は広いが排水の良い粘質がかった土壌が適す。
大	強	や開張性	多	7月下	円	中	紫紅	良	全道。土壌適応性は広いが排水の良い粘質がかった土壌が適す。
中	や強	や開張性	中	7月下	円	中	緑黄	良	全道。土壌適応性は広いが排水の良い粘質がかった土壌が適す。
中	や強	や開張性	多	7月下	円	や小	暗赤	良	全道。土壌適応性は広いが排水の良い粘質がかった土壌が適す。

開花期	草丈	葉数	花色	花形	花序	花梗	蕾毛	萼色	木 子	珠 芽	葉の着生	葉色	葉形	球根の色
月 日 6. 10	70 ^{cm}	78 ^枚	鮮紅色	上向	輪生	やや長	少	緑	普通	なし	密	緑	披針形	白
6. 10	70	78	鮮紅色	上向	輪生	やや長	少	緑	普通	なし	密	緑	披針形	白
6. 21	37	93	赤橙	上向	輪生	中	有中	緑	僅かに有	なし	水平		披針形	白
6. 20	48	86	黄橙	上向	輪生	中	有中	緑	ほとんどなし	ほとんどなし	垂下		披針形	白
6月下旬～7月上旬	35～40	60	濃黄	スカシ横向	輪生	中	なし	緑	僅かに有	なし	水平		披針形	白

トマト

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性						栽 培 適 地
					草勢	熟期	果型	果色	果実	耐病虫性	
ひ か り	51	1972 (1961)	1979	園芸生産研	中	中	豊円	濃桃	172		全道一円
宝 冠 2 号	52	1972 (1963)		武蔵野種苗	中～強	早～中	豊円	濃桃	200		"
米 井	53	1972 (1965)	1979	タキイ種苗	中～強	早～中	豊円	濃桃	171		"
東 光	54	1972 (1961)		む さ し	中	早～中	豊円	濃桃	175		"
強 力 米 井	55	1972	1979	タキイ種苗	強	中	豊円	濃桃	200	F. TMV C L	"
強 力 五 光	56	1972	1979	む さ し	強	中	豊円	鮮桃	156	F. C L. N	"

トマト

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性						栽培適地
					草勢	熟期	果型	果色	果重	耐病虫性	
強 力 月 光	57	1972	1979	む さ し	強	中	豊円	濃桃	180	F.C.L.N	全道一円
ウ ル バ ー ナ	トマト北海道 道輪第1号	1972 (1965)	1979	導 入	強	早～ 晩	扁円 球 豊満	赤	100	中	"
ファイアー ボール	トマト北海道 道輪第2号	1972 (1966)	1979	導 入	強	早	豊満	濃赤	100		"
早 生 だ る ま	164	1977		松 永	強	早	豊満	濃赤	70		道央以南
交 1 号	165	1977		北 農 試	強	早	豊満	赤	110		"
れ い ぎ ょ く	166	1977		長野農試	強	早	豊満	濃赤	120	F	"

注) 1) 果重は主として北農試のデータ(1970年)

2) 耐病虫性: F(萎ちょう病) TMV(タバコモザイク病) CL(はかび病) N(根こぶ線出)の略

32 ナ ス

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	草姿	熟期	分枝	果形	果色	収量	栽培適地
金井新交鈴成	58	1973 (1960)	1979	金 井	開張	早	多	長卵	濃黒紫	多	全道一円
新 橋 真	59	1973 (1960)	1979	ヤマト種苗	開張	早	多	長卵	濃黒紫	多	"
郡 真 5 号	60	1973 (1970)	1979	群 馬	や立	早	多	長卵	漆黒	多	"
金 井 早 真	61	1973 (1970)	1979	金 井	立	極早	多	中長	濃黒紫	多	"
千 岡	62	1973		タキイ種苗	半 開張	早	多	長卵	漆黒	多	"
長 岡 長	63	1973	1979	タキイ種苗	半 開張	極早	多	長	漆黒	多	"

33 ビーマン

品 種 名	登録番号	決定年	廃止年	育成場所	特 性						栽培適地
					草 勢	熟 期	分枝性	果 形	果 重	果肉の 厚 さ	
緑 王	64	1973 (1963)	1979	む さ し	開 張	極 早	多	4 角 長 果	40 g	中	全道一円
エ ー ス	65	1973 (1970)		タキイ種苗	開 張	極 早	多	中獅子	50	中	"
に し き	66	1973 (1970)	1979	園 芸 研	半 開	中 早	多	長獅子	40	厚	"

34 キュウリ

品 種 名	登録番号	決定年	廃止年	育成場所	特 性									栽培適地
					草勢	葉の 大小	低温伸 長性	着果 習性	果形	果色	いぼ の色	収量	作 型	
長 日 青 節 成	30	1972	1979	ヤマト種苗	強	大	良	主	長	緑	黒	多	促成用	全道一円
久留米落合H型	31	1972	1979	久留米原種 育成会	強	中	良	主	長	濃緑	黒	多	促成用	"
夏 崎 落 3 号	32	1972	1979	埼玉原種 育成会	強	中	良	主	長	濃緑	白	多	露地用	"
小 城 節 成	41	1973 (1956)	1979	フジイ種苗	強	中	良	主	長	濃緑	黒	中	露地用	"
翠 青 2 号	42	1973 (1956)	1979	タキイ種苗	強	中	良	主	長	濃緑	黒	多	促成用	"
ときわ夏節	43	1973 (1963)	1979	サカタ種苗	強	小	中	側	中	濃緑	白	多	露地用	"
亀 交 春 秋	44	1973 (1964)	1979	渡辺農事	強	大	良	主	長	淡 濃緑	黒	多	抑制用	"
松 の み どり	45	1973 (1965)	1979	日本園芸 生 産 研	強	中	良	主	長	濃緑	黒	多	促成用	"
長 交 ときわ	46	1973 (1970)	1979	タキイ種苗	強	中	中	主	長	濃緑	白	多	露地用	"
さつきみどり	47	1973 (1970)	1979	サカタ種苗	強	小	中	側	長	濃緑	白	多	露地用	"
み な づ き	48	1973 (1970)	1979	カネコ種苗	強	大	良	主	中	濃緑	黒	多	促成用	"
な つ み どり	49	1973 (1970)	1979	神田育種	強	大	中	側	長	濃緑	白	多	露地用	"

35 メロン

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	分 類	草勢	果形	果皮 色	果肉 色	果重	成熟 日数	栽 培 適 地
北海道キング系	67	1973	1979	各 社	ネット	強	長円	灰緑	桃	kg 1.8	45	全道一円
アールス フェボリット	68	1973		"	ネット	中	円	灰緑	緑	1.4	55	"
ブ リ ン ス	69	1973 (1967)		サカタ種苗	ノー ネット	強	長円	灰緑	桃	0.6	40	"

36 スイカ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	分類	草勢	果皮 色	果肉 色	果 重	糖度	成熟 日数	栽 培 適 地
大 和 西 瓜	スイカ北海 道移第1号	1972	1979	大和農園	摘皮	強	鮮緑 条斑	緋赤	kg 6~7	% 11	日 40	全道一円
新 三 笠	70	1973 (1962)	1979	南都農園	摘皮	強	鮮緑 条斑	緋赤	5~6	12	40	"

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	分類	草勢	果皮色	果肉色	果 重	糖度	成 熟 日 数	栽 培 適 地
綺 王	71	1973 (1968)		大和農園	縞皮	強	鮮緑 条斑	鮮赤	kg 5~6	% 12	日 40	全道一円
早生金剛	72	1973 (1970)	1979	みかど	縞皮	強	濃緑 条斑	鮮黄	7	11	45	"

37 カボチャ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	草 勢	果 形	果皮色	果 重	成熟 日数	収 量	栽 培 適 地
美國デリシャス	73	1973 (1954)	1979	雪印種苗	強~中	ハート 型	暗 緑	2.6 kg ~3.5	55	多	全道一円
芳 香 青 皮	74	1973 (1969)	1979	渡 辺	強	扁 円	帯灰緑	1.0 ~1.5	30	中	"
錦 芳 香	75	1973 (1970)	1979	渡辺園研	強	扁 円 突	濃 緑 白緑斑	1.0 ~1.5	30	中	"
え び す	76	1973 (1972)		タキイ種苗	強	扁 円	濃 緑 淡緑条斑	0.9 ~1.2	25	中	"

38 イチゴ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性									栽 培 適 地
					草勢	葉の 大きさ	ランナ 発生数	果色	果の 大小	果形	熟期	収量		
ホ レ ラ	23	1972	1979	導 入	強	中	中	鮮紅	中	球円 錐	中	多	全道一円	
盛 岡 16 号	イチゴ北海 道移第1号	1973		野 菜 試	強	大	中	淡紅	大	円錐	中	少	〃	
幸 玉	77	1973 (1961)	1979	玉 利 氏	強	中	多	紅赤	中	円錐	晩	多	〃	
ゲ ナ ー	78	1973 (1961)	1979	導 入	強	大	中	濃紅	中～ 大	円錐	中	中	〃	
レ ッ ド コ ー ト	79	1973 (1965)	1979	〃	強	中	多	濃紅	中	円錐	中	中	〃	
キ ャ ベ リ ア	80	1973 (1965)	1979	〃	中	中	多	紅	中	円錐	中	中	〃	
宝 交 早 生	81	1973 (1970)		兵庫農試	強	中	多	鮮紅	中～ 大	円錐	早	多	〃	

39 キャベツ

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							性 性			栽培適地
					草勢	球形	シマリ	肉質	球重	耐暑性	結球 日数	収量性	作型		
コペンハーゲン マーケット	キャベツ 北海道輪第1号	1972 (1924)	1979	導 入	中	丸	良	不良	中	中	日 90	小	早出	全 道	
サクセション	キャベツ 北海道輪第2号	1972 (1924)	1979	"	強	扁円	中	良	や大	強	120	中	秋	"	
札幌甘らん	キャベツ 北海道輪第3号	1972 (1924)		各 社	強	扁円 腰高	良	中	極大	中	150	多	秋貯	"	
中 村 仲 秋	82	1973 (1950)	1979	中 村 採 種	強	扁円	良	中	大	中	120	中	秋	"	
ア ラ ス カ	83	1973 (1967)		導 入	中	球	良	極良	小	中	90	小	早出	"	
C M	84	1973 (1967)		タ キ イ	中	球	良	良	小	中	95	小	早出	"	
四 季 穫	85	1973 (1969)	1979	タ キ イ	強	扁円 腰高	良	不良	大	強	120	中	夏秋貯	"	
晩 抽 理 想	86	1973 (1969)		タ キ イ	強	扁円	良	中	中	強	120	中	秋貯	"	
S E	87	1973 (1970)		長野農試	強	扁円	良	良	中小	強	120	中	秋	"	
夏 蒔 理 想	88	1973 (1970)	1979	タ キ イ	強	扁円 腰高	良	中	や大	強	115	中～ 多	秋	"	
2 月 穫	89	1973 (1970)	1979	タ キ イ	強	扁円	良	良	中	中	120	中	秋	"	
初 秋	90	1973 (1970)	1979	タ キ イ	強	扁円	良	良	中～ 小	極強	120	中	夏秋	"	
大 丸 と も え	91	1973 (1970)	1979	中 村 採 種	強	扁円	良	良	大	中	150	多	秋貯	"	
長 岡 早 生	92	1973 (1970)	1979	タ キ イ	強	扁円	良	良	中	強	120	中	早出	"	

40 カリフラワー

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					草 姿	花蕾色	シマリ	花蕾重	成 日	熟 日	収 量	
アーリー スノーボール	その他北海 道輪第2号	1972		導 入	半開張	白	良	kg 0.8	45	日	中	全道一円

41 ハクサイ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地	
					草勢	球形	シマリ	1 球重	収量	結球 日数	耐病 虫性		作型
仲 秋	93	1973 (1963)		渡 辺	強	円筒	良	4	多	85	中	秋	全 道
王 将	94	1973 (1963)		タ キ イ	強	円筒	良	4	多	85	強	秋	〃

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性								栽培適地
					草勢	球形	シマリ	1球重	収量	結球 日数	耐病 虫性	作型	
大 関	95	1973 (1963)	1979	タ キ イ	強	円筒	良	3～4	多	85～ 90	強	秋	全 道
オ リ ン ピ ア	96	1973 (1966)		渡 辺	強	円筒	良	4～5	多	90～ 100	強	秋	"
春 蒔 極 早 生	97	1973 (1967)	1979	タ キ イ	中	円筒	良	1.5～ 2.0	小	70	強	早出	"
長 交 2 号	98	1973 (1970)	1979	タ キ イ	中	短円筒	良	2.2～ 2.6	小	70	中	早出	"
横 綱	99	1973 (1972)	1979	タ キ イ	強	円筒	良	4	多	85	強	秋	"
無 双	100	1973 (1972)		タ キ イ	中	円筒	良	2.5～ 3.5	中	75	強	早出	"
60 日 み どり	101	1973 (1972)	1979	タ キ イ	中	円筒	良	2～3	中	75	強	早出	"

42 つけ菜

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					分類	草姿	葉形	葉色	葉柄色	辛味	収量	
白 茎 体 菜	その他北海道第3号	1972	1979	各 社	体菜	立	半結球	緑	白	なし	中	全道一円

43 タマネギ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽 培 適 地
					草姿	抽苔	倒伏指	球形	外皮色	球重	貯蔵性	
オータム フライド	24	1972		導 入	や立	少	月日 9. 5	球	黄	g 160	良	全道一円
札 幌 黄	タマネギ 北海道輪第1号	1972 (1924)		導 入 選 抜	中	少	9. 1	球	黄	160	並	"
アーリーイエロー グローブ	123	1973 (1962)	1979	導 入	立	少	9.12	球	黄	150	並	全道一円
ア ン コ ー ル	124	1973 (1962)	1979	導 入	や立	少	9. 4	球	黄	144	並	"
北 見 黄	162	1976		北見農試	中	少	8.30	球	黄	160	並	網 走

44 ネギ

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性								栽培適地
					分類	分けつ	葉色	葉しよ う部色	1株重 g	低 温 伸長性	越冬性	収量	
加 賀 太 葱	長ネギ 北海道移第1号	1972	1979	各 社	2年	中～少	濃緑	白	200	不良	強	中	全道一円
札 幌 根 深	108	1973	1979	"	2年	中～少	濃緑	白	200	不良	極強	中	"
松 本	109	1973	1979	"	2年	中～少	濃緑	白	250	不良	強	中	"
石 倉	106	1973 (1967)		"	1年	少	緑	白	350	良	弱	多	"
金 長	107	1973 (1967)		協 和	1年	少	緑	白	350	極良	弱	多	"

45 ホウレンソウ

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					草姿	株張	葉欠刻	葉柄	作 型	種子形	収量	
キングオブ デンマーク	ほうれん草 北海道輸第1号	1972 (1933)	1979	導 入	半匍	中	無	長	月 6.7	丸	多	全 道
ノ ー ベ ル	ほうれん草 北海道輸第2号	1972	1979	"	半匍	中	無	短	5.8	丸	多	"
ピロフレー	ほうれん草 北海道輸第3号	1972	1979	"	半匍	大	無	中	4.8	丸	多	"
ミンスター ランド	ほうれん草 北海道第4号	1972		"	半匍	大	多	長	3.9	針	多	"
札 幌 大 葉	ほうれん草 北海道第5号	1972 (1953)		北 農 試	半匍	中	無	短	4.8	丸	多	"
伊 達 在 来	102	1973 (1954)		伊 達 農 園	半匍	大	無～小	中	2～4	丸	中	"
バイキング	103	1973 (1954)		導 入	半匍	中	無	短	5.8	丸	多	"
ニューサッポロ	104	1973 (1970)		雪 印	半立	中	中	中	4.8	丸	多	"
ニューアジア	105	1973 (1970)		永 池	立	大	大	長	2～3 9～10	針	中	"

46 セルリー

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					草 姿	草 長	葉 色	葉柄色	ス入り	せんい質	収 量	
コーネル 619	110	1973 (1962)		導 入	半 立	長	黄 緑	黄 緑	小	小	中～多	全道一円
ユ タ 系	111	1973 (1972)	1979	導 入	立	長	緑	緑	小	中	多	"

47 レタス

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					分類	球形	シマリ	球重	抽苔	耐寒性	耐病性	
ワイヤヘッド	その他 北海道輪第1号	1972	1979	導 入	半結球			中	遅	強	強	全道一円
ペンレーク	112	1973 (1964)		"	結球	円	良	や大	遅	中	中	"
プレート レークス	113	1973 (1964)		"	結球	円	良	大	遅	強	強	"

48 パセリ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					草勢	株張	葉色	葉形	耐寒性	日持	収量	
エメラルド1号	その他 北海道輪第4号	1972	1979		強	良	濃緑	縮葉	強	良	中	全道一円

49 アスパラガス

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					草丈	太さ	色	先端 しまり	鱗片	品質	収量	
カリフォルニア500	114	1973 (1966)		導 入	高	太	緑	良	密	良	や多	全道一円
カリフォルニア500W	115	1973 (1966)		導 入	高	太	緑	良	密	良	多	"

50 ダイコン

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽培適地
					草 姿	葉色	根色	根形	根長 cm	収量	作 型	
練馬尻細	だいこん 北海道第1号	1972	1979	各 社	や開張	濃緑	白	円筒 尻細	50	多	秋	全道一円
宮 重	だいこん 北海道移第2号	1972 (1924)		"	や立	濃緑	青首	円筒 尻細	60	多	秋	"
時無大根	だいこん 北海道第3号	1972 (1924)	1979	"	半開張	濃緑	白	円錐	30	小	春～夏	"
みの早生系	116	1973 (1954)		"	半開張	濃緑	白	円錐 中太	70	多	秋	"
大 蔵	117	1973 (1970)		石井泰次郎	開 張	濃緑	白	円筒 尻詰	40	多	秋	"
聖 護 院	118	1973 (1970)		各 社	立	濃緑	白	長球	15	多	秋	"
理 想	119	1973 (1970)		み か ど	や立	濃緑	白	円筒 尻細	60	多	秋	"
秋 づ ま り	120	1973 (1970)	1979	各 社	や開張	濃緑	白	円筒 尻詰	40	多	秋	"

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽 培 適 地
					草 姿	葉色	根色	根形	根長	収量	作 型	
日 の 出	121	1973 (1970)	1979	各 社	半開張	濃緑	白	円筒	40	中	春～夏	全道一円
(廿日大根) ラビットレッド	その他 北土道輸第5号	1972 (1927)	1979	導 入	立	濃緑	赤	球	2	小	春～秋	"

51 カ プ

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽 培 適 地
					草姿	葉色	葉柄色	根形	根色	成熟 日数	収量	
札幌紫	その他 北海道輸第6号	1972 (1924)	1979	導入選抜	立	濃緑	帯紫緑	扁円	紫	50	多	全道一円
大野紅熊青	その他 北海道移第7号	1972 (1924)	1979	渡島支場	立	紫紅	鮮 紅	扁円	鮮紅	50	多	〃
寄居熊青	その他 北海道移第8号	1972 (1924)	1979	各 社	立	鮮緑	淡 緑	扁円	白	30	中	〃
金町子かぶ	122	1973		各 社	立	鮮緑	淡 緑	扁円	白	30	中	〃

52 ニンジン

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽 培 適 地
					草姿	葉色	根 形	根 色	芯の 大小	成熟 日数	収量	
アーリー チャンテネー	にんじん 北海道輸第1号	1972 (1924)	1979	導 入	立	濃緑	長円錐 尻 詰	橙	中	H 120	多	全道一円
中 村 鮮 紅 太	125	1973 (1950)	1979	中 村 採 種	立	濃緑	長円錐	濃橙紅	中	120	多	"
5 寸 系	126	1973 (1972)	1979	導 入	立	濃緑	長円錐 尻 詰	濃橙紅	中	120	多	"

53 ゴボウ

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特 性							栽 培 適 地
					草姿	葉色	根形	根長	太さ	根色	す入り	
札幌大長	その他 北海道第9号	1972	1979	各 社	立	緑	長	cm 80	cm 2.5	褐色	中	全道一円

54 食用ユリ

品 種 名	系統番号	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特 性								栽培 適地
						草姿	草丈 cm	花色	球形	球色	球重 g	苦味	収量	
角 田 百 合		ゆり 北海道第1号	1972	1979		立	80	橙紅	圓球	白	100	なし	中	全道 一円
北 海 白 百 合	空系1号	ゆり 北海道第2号	1972 (1965)	1979	空知支場	立	60	橙紅	圓球	白	150	なし	多	"

VI 飼 料 作 物

55 オーチャードグラス

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
北海道在来種		オーチャードグラス 北海道第1号	1971 (1914)		日高種牧	アメリカから導入	早生。茎太く、茎数が多い。 葉幅・葉長大。再生力旺盛	全道
フ ロ ード	Frode	オーチャードグラス 北海道第2号	1971 (1958)	1979	スエーデン	スエーデンから導入	晩生。多葉型で葉長・葉幅 比較的大。耐寒性大。耐病 性にやや弱。再生力旺盛。	オーチャードグラス 栽培地帯
キタミドリ*	月寒在来	オーチャードグラス 北海道第3号	1971 (1968)		北海道農試	集団選抜	早生。草型は中間、再生良 好。すじ葉枯病に強、雲型 病にやや弱。耐寒性	全道
フロンティア		オーチャードグラス 北海道合第4号	1972		雪印種苗	合成品種法	中生。葉長。葉幅が大、茎 が太い、直立、すじ葉枯病 に強、雲型病にやや弱、多収	全道
オカミドリ*	北海2号	オーチャードグラス 北海道合第5号	1976		北海道農試	合成品種法	晩生。葉長。葉幅が大、耐 病性大、耐寒性は強。	全道
ホクレン改良種		1	1971		ホクレン	集団選抜法	キタミドリとはほぼ同様	根領地域を除く全道
ヘイキング	雪印 改良1号	2	1971		雪印種苗	集団選抜法	極晩生。葉部率が高い。耐 病性は並。	道東地域を除く全道
ドリーゼ	Dorise	4	1971		オランダ	オランダから導入	中生。葉部率が高い。葉は 極細。	オーチャードグラス 安定地帯
フィロックス デンフェルト	Phyllox Daehnfeldt	5	1971		デンマーク	デンマークから導入	中生。茎数多、耐寒性、永 続性やや弱。	オーチャードグラス 安定地帯
マスハーディ	Masshardy	6	1971		アメリカ	アメリカから導入	晩生。大粒置核病に強、雲型 病に強。耐寒性大。	オーチャードグラス 安定地帯
ケ イ	Kay	175	1978		カナダ	カナダから導入	晩生。葉長。葉幅が大、茎 が太い、大粒置核病および 小粒置核病に強。	オーチャードグラス 安定地帯

56 チモシー

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
クライマックス	Climax	チモシー 北海道第1号	1971 (1962)	1979	カナダ	カナダから導入	採草型、中生。多葉性、黒 さび病に強、再生良好	全 道
北 王	雪印 改良1号	チモシー 北海道第2号	1971 (1969)		雪印種苗	集団選抜法	採草型、早生。耐病性大、 多収	全 道
セ ン ボ ク*	北系 4305	チモシー 北海道第3号	1971 (1969)		北見農試	集団選抜法	採草型、早生。強悍、耐倒 伏性。多葉性、再生力良、 耐病性大、多収	全 道

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
ノ サ ッ プ*	北見2号	チモシー 北海道第4号	1977		北見農試	合成品種法	採草型、早生、茎が太い、 多葉性、再生良好、耐病性大	全 道
ホ ク シ ョ ウ*	北見7号	チモシー 北海道第5号	1977		北見農試	集団選抜法	ほふく型、晩生、耐病性大 再生良好、採草・放牧兼用	全 道
ホクレン改良種		7	1971		ホクレン	集団選抜法	採草型、早生、耐病性大、 多収	全 道
ノースランド	Heidemij	8	1971		オランダ	オランダから導入	ふほく型、極晩生、分けつ 数多い、耐病性弱	全 道

57 イタリアンライグラス

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
ビ リ オ ン	Billion	11	1971		オランダ	オランダから導入	春播性高い、早生、生育期 間は短い、直立型、稈は太 く、葉幅が広い、斑点病強。	全 道
マンモス イタリアンB		12	1971		雪印種苗	倍数性育種 法 母系選抜法	春播性高い、早生、生育期 間は短い、直立型、稈は太 く、葉が大きい、冠さび病に弱	全 道

58 ペレニアルライグラス

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
リ ベ ー ル	Reveille	168	1978		オランダ	オランダから導入	中生の晩、葉幅広く、茎は 太い、耐病性強、再生良好	道北、道央 道南地域
ピ ー ト ラ	Petra	169	1978		オランダ	オランダから導入	極晩生、再生良好、耐病性 強、雪ぐされ大粒菌核病に は弱	道北、道央 道南地域
マ ン モ ス		170	1978		雪印種苗	集団選抜法	晩生、葉幅は広い、冠さび 病強、雪ぐされ病弱	道北、道央 道南地域

59 メドーフェスク

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
レトー デンフェルト	Leto Daehnfeldt	13	1971		デンマーク	デンマーク から導入	早生、直立型、網斑病に強	全 道
タ ミ ス ト	Tammisto	171	1978		フィンランド	フィンランド から導入	出穂始は「レトー」よりやや 遅い、越冬性は良、耐病性 は並	全 道
ト レ ー ダ ー	Trader	172	1978		カナダ	カナダから 導入	出穂始は「レトー」よりやや 遅い、越冬性は並、耐病性 は並、再生良好	全 道
フ ェ ー ス ト	雪印 合成1号	173	1978		雪印種苗	合成品利法	出穂始は「レトー」並、越冬 性良、再生良好、耐病性は並	全 道

60 トールフェスク

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
ホ ク リ ョ ウ*	北海 1 号	トールフェスク 北海道台第 1 号	1972		北海道農試	合成品種法	晩生、草丈高く多葉性、網斑病に強、雪腐病に強、夏枯に弱、多収	全 道
ヤ マ ナ ミ*	北海 2 号	トールフェスク 北海道台第 2 号	1972		北海道農試	合成品種法	極早生、葉の病害に強、雪腐病に弱、夏枯れに強、多収	全 道
ケンタッキー 31フェスク	Kentucky 31	14	1971		アメリカ	アメリカから導入	早生、草質は粗剛、越冬性はやや弱	全 道

61 ケンタッキーブルーグラス

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
ケンブルー	Kenblue	15	1971		アメリカ	アメリカから導入	早生、茎が密生、銹病に弱多収	全 道
ト ロ イ	Troy	174	1978		アメリカ	アメリカから導入	早生、銹病にやや強、めん羊の採食は不良、春季の草勢がすぐれ秋季の草勢低下が小	全 道

62 リードカナリーグラス

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
アイオリード		9	1971		アメリカ	アメリカから導入	草丈が高く粗剛、嗜好性は劣る。	全 道

63 マウンテンブロームグラス

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
テ イ ネ		10	1971		雪印種苗	母系選抜法	早生、病害低抗性は強、多収	道央地域

64 アカクローバ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
サ ッ ボ ロ*	月系37-1	クローバ類 北海道第 1 号	1971 (1966)		北海道農試	集団選抜法	早生、葉は大きく葉斑は鮮明、再生は良好、耐病性强、小粒菌核病にやや弱、多収	全 道
ハ ミ ド リ		クローバ類 北海道第 2 号	1971 (1966)		雪印種苗	集団選抜法	早生の晩、冬枯に強、茎割病にやや強、さび病抵抗性は並	全道、特に道北地域
レッドヘッド	Red Head	クローバ類 北海道輪第 3 号	1972		オランダ	オランダから導入	早生の晩、葉は大きく、葉斑はやや不鮮明、草姿は巨大、耐病性はやや強	道央、根釧地域

65 シロクロローバ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
カリフォルニア ラジノ	California Ladino	19	1971		ア メ リ カ	アメリカから導入	はふく茎の密度が大、開花期が早い。	全 道
ミルカバイピア		20	1971		デンマーク	デンマークから導入	冬枯に強く、放牧適性が大コモン型	道北、道東
ニュージーランド ホホワイト	Newzealand white	21	1971		ニュージー ランド	ニュージー ランドから 導入	葉は大きく、密性、多収。 耐病性強、再生力良好、コ モン型、ラジノ型	道央、道南
ロディギアノ	Ladino Digante Lodigiano	151	1975		イ タ リ ア	イタリアから導入	葉は大きく、葉柄は長く、 はふく茎も太い巨大型、多 収、ラジノ型。	全 道
リ ー ガ ル	Regal	152	1975		ア メ リ カ	アメリカから導入	耐寒性、耐旱性は強、耐病 性は強、多収、ラジノ型	全 道

66 アルファルファ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
デュピュイ	Du Puits	アルファルファ 北海道輪第1号	1971 (1958)	1979	フ ラ ン ス	フランスから導入	早生、紫花種、草型は直立、 葉部病害抵抗性大、冬枯れ 少、多収。	全 道
サラナック	Saranac	アルファルファ 北海道輪第2号	1971		ア メ リ カ	アメリカから導入	早生、草型は直立、紫花種、 耐病性強、冬枯れ少、多収。	道北、道央の アルファル ファ栽培可能地 帯
ウィリアムス バーグ	Williams- burg	18	1971	1978	ア メ リ カ	アメリカから導入	同 上	同 上
ア ル フ ァ	Alfa	17	1971		スウェー デン	スウェーデ ンから導入	早生、紫花種、草型は直立、 耐病性強、冬枯れ少、多収。	東北、道央
ヨ ー ロ ッ パ	Europe	150	1975		ア メ リ カ	フランスから導入	早生、紫花種、草型は直立、 倒伏に強い、多収。	根領地域を 除く全道
ソ ア	Thor	167	1978		ア メ リ カ	アメリカから導入	早生、紫花種、草型は直立、 耐病性強、冬枯れ少、多収。	全 道

67 バーズフットトレフォイル

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性	栽培適地
バイキング	Viking	22	1971	1978	ア メ リ カ	アメリカから導入		

68 飼料用ビート

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性
シュガー マンゴールド	Sugar Mangold	飼料ビート 北海道輸第1号	1971 (1939)		英 国		多収、肉質ち密で乾物多く、貯蔵性に富む

69 飼料カブ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性
紫 九 蕪 菁		飼料用カブ 北海道第1号	1971 (1931)				早生であり、比較的低温でもよく肥大する。肉質は食用かぶに比して硬いが、飼料かぶのなかでは比較的軟かく、根部の乾物率も低い。貯蔵性も低い。

70 ルタバガ

品 種 名	系統番号	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主 要 特 性
ネムロルタバガ		ルタバガ 北海道第1号	1971 (1954)		根室支場	集団選抜法	白腐病に対して強く、収量は年次偏差少なく多収、肉質は硬い
マゼスチック 1号		ルタバガ 北海道第2号	1971 (1959)		根室支場	集団選抜法	白腐病にはかなり強く多収、肉質はルタバガとしてはやや軟かい
グリーントップ	Green top	40	1971 (1963)				根部にき裂を生じやすく、白腐病罹病性はやや高いが、根腐病には極めて強抵抗性を示す。

草 丈	葉 数	根 形	根 色		肉 色	そ の 他	栽 培 適 地
			地上部	地下部			
中	中	紡錘形	緑	白	白	根部4割露出	全道一円

姿 勢	葉 色	葉柄色	根 形	根 色		肉 色	肉 質	そ の 他	栽 培 適 地
				地上部	地下部				
直 立	緑	淡紫色	球	紫	白	白	軟	根部4～5割露出	全道一円

姿 勢	葉 色	葉 柄 色		頸 長	頸 色	根 形	根 色		肉 色	側根の 多 少	その他	栽 培 適 地
		生育盛期	収穫期				地上部	地下部				
中 間	緑	下部 淡赤紫	下部 赤 紫	中	暗 紫	球	赤 紫	白	白	少	根部 $\frac{1}{2}$ ～ $\frac{1}{3}$ 露出	全道とくに根頸の内陰部の白腐病多発地帯
や直立	や淡緑	下部極 淡赤紫	下部 淡赤紫	長	暗 紫	円 錐	鮮赤紫	クリーム	クリーム	少	根部 $\frac{1}{2}$ ～ $\frac{1}{3}$ 露出	全道とくに根頸の白腐病の多発しない地帯
や開張	淡緑	黄白色	淡黄緑	短	黄緑	や球形	黄緑	クリーム	クリーム	中	根部 $\frac{1}{2}$ ～ $\frac{1}{3}$ 露出	根頸、天北で根腐病多発地帯に適す