

成績概要書 (2008 年 1 月作成)

研究課題 : 生ビートパルプ、スイートコーンパルプ、規格外ニンジンの飼料価値
(地域資源を有効活用した自給飼料主体 TMR 供給システムの開発)

担当部署 : 道立畜産試プロジェクトチーム

予算区分 : 道費(重点領域特別研究)

研究期間 : 2005～2007 年度(平成 17～19 年度)

1. 目的

飼料コストの削減を目的として価格の安い農産副産物の有効利用を図るため、資源量が比較的多く、飼料価値が明らかにされていなかった「生ビートパルプ」、「スイートコーンパルプ」、「規格外ニンジン」のサイレージ発酵品質および飼料価値を明らかにする。

2. 方法

1) 生ビートパルプサイレージの飼料価値

処理:糖蜜添加水準 5(0, 5, 10, 15, 20%)

調査項目:化学組成、TDN 含量、泌乳牛の嗜好性および採食量

2) スイートコーンパルプサイレージの飼料価値

処理:スイートコーンの収穫時期 3(8 月下旬、9 月上旬、9 月中旬)

調査項目:化学組成、TDN 含量、泌乳牛の嗜好性および採食量

3) 規格外ニンジンサイレージの飼料価値

処理:水分調整材添加 6(①無添加、②ビートパルプ 20%添加、③同 40%添加、
④規格外小麦 20%添加、⑤同 40%添加、⑥同 60%添加)

調査項目:化学組成、TDN 含量、泌乳牛の採食量

3.成果の概要

1) 生ビートパルプサイレージの飼料価値(表 1)

- (1)生ビートパルプサイレージは、V スコア 98 と発酵品質は良好であった。
- (2)糖蜜無添加の生ビートパルプサイレージは、乾燥ビートパルプに比べてNDF 含量が多いが(65.7 vs. 50.0%)、TDN 含量は同程度であった(72.0 vs. 74.6%)。
- (3)糖蜜添加量の増加に伴い、NDF 含量は低下し、嗜好性および採食量が高まる傾向にあった。TDN 含量は糖蜜 10%添加が 73.2%でもっとも高く、糖蜜を添加する場合の添加量は 10%が適当と考えられた。糖蜜を 10%添加した本サイレージの自由採食量は乾物 9.7kg であった。

2) スイートコーンパルプサイレージの飼料価値(表 2)

- (1)いずれの収穫時期でもサイレージの V スコアは 96 以上と発酵品質は良好であった。
- (2)化学成分および TDN 含量は、乳熟期のとうもろこしサイレージと同程度であった。収穫時期が遅いスイートコーンパルプサイレージほどデンプン含量および TDN 含量が高まった。
- (3)自由採食量は黄熟期のとうもろこしサイレージよりもやや劣るが、乾物で 9.7～12.8kg/日であり、収穫時期が遅いほど採食量は多くなる傾向にあった。

3) 規格外ニンジンサイレージの飼料価値(表 3)

- (1)無細切の規格外ニンジンのみでも脱気密閉により、良質なサイレージ発酵が得られた。
- (2)ニンジンは水分含量が高いためサイレージの乾物歩留まりは 55%程度と低いが、ビートパルプや規格外小麦などの水分調整材を混合することにより、サイレージの乾物率および乾物歩留まりは高まった。
- (3)ニンジンサイレージは水分含量が 90%以上と高いが、乾物中の TDN 含量は 81%と高かった。
- (4)ニンジンサイレージの泌乳牛への給与量は現物 30kg(乾物 3kg)程度が上限と考えられた。

以上のことから、生ビートパルプ、スイートコーンパルプ、規格外ニンジン各サイレージは発酵品質が良好、かつTDN含量も高いこと、またこれらは酪農現場での利用事例もあることから、泌乳牛用の TMR 用飼料としても十分活用可能である。

表1 糖蜜を添加した生ビートパルプサイレージの発酵品質、化学成分、嗜好性および採食量

処理 (糖蜜添加量 ¹⁾)	発酵品質			化学成分			TDN 含量	嗜好性 ²⁾ 頭数	採食量 ³⁾ (乾物) kg/日
	pH	VBN/TN	Vスコア	乾物 %	CP	NDF			
無添加	3.6	2	98	16.8	9.4	65.7	72.0 ^a	2/40	6.3 ^b
5%	3.8	2	98	17.6	10.1	61.3	72.3 ^a	12/40	8.8 ^{ab}
10%	4.1	3	96	17.7	10.5	56.9	73.2 ^a	23/40	9.7 ^b
15%	4.3	3	97	18.9	10.4	57.2	66.6 ^b	33/40	10.2 ^a
20%	4.3	3	97	18.2	11.0	51.1	70.2 ^{ab}	31/40	10.8 ^a
(参考) 乾燥ビートパルプ ⁴⁾	-	-	-	86.6	12.6	50.0	74.6	-	-

1) 添加量は乾物比、糖蜜の成分:乾物57.8%、灰分35.7%

4) 日本標準飼料成分表

2) 一対比較法総当りによる(選択頭数/供試頭数)

a,b 異文字間に有意差あり(P<0.05)

3) 乾物11kgを上限として給与

表2 収穫時期の異なるスイートコーンパルプサイレージの発酵品質、化学成分、嗜好性および採食量

処理 (収穫時期)	発酵品質			化学成分			TDN 含量	嗜好性 ²⁾ 頭数	採食量 (乾物) kg/日
	pH	VBN/TN	Vスコア	乾物 %	CP	NDF			
8月下旬	3.4	6	96	18.0	9.6	60.0	63.0	1/36	9.7 ^c
9月上旬	3.4	6	97	17.7	10.0	61.0	7.1	11/36	10.3 ^{bc}
9月中旬	3.4	4	99	21.2	10.5	53.6	14.1	9/36	12.8 ^b
(参考) とうもろこしサイレージ ¹⁾	4.0	6	98	19.0	8.6	55.3	9.3	64.2	15/36

1) 発酵品質、嗜好性および採食量は黄熟期、化学成分およびTDN含量は乳熟期とうもろこしサイレージの値

2) 一対比較法総当りによる(選択頭数/供試頭数)

a,b,c 異文字間に有意差あり(P<0.05)

表3 水分調整材を添加した規格外ニンジンサイレージの発酵品質、化学成分および採食量

処理 (調整材添加量)	発酵品質			化学成分			TDN 含量	乾物 歩留	TDN 歩留 ¹⁾	採食量 ²⁾	
	pH	VBN/TN	Vスコア	乾物 %	CP	NDF				現物	乾物
無添加	3.6	5	98	7.7	10.7	33.3	81.0	55	44	34.3	2.9
ビートパルプ20%添加	3.5	10	90	8.8	12.9	40.8	82.3	59	51	29.5	3.0
ビートパルプ40%添加	3.4	3	100	9.0	12.4	40.4	80.9	58	57	31.9	3.5
規格外小麦20%添加	3.5	2	100	8.8	12.0	31.5	87.8	50	50	30.3	4.0
規格外小麦40%添加	3.5	3	100	14.2	11.8	25.0	81.9	69	65	34.7	4.9
規格外小麦60%添加	3.7	3	99	15.0	12.7	23.5	83.3	67	64	-	-

1) TDN歩留=TDN含量×乾物歩留

2) 現物40kgを上限として給与

4. 成果の活用面と留意点

1) 生ビートパルプ、スイートコーンパルプおよび規格外ニンジンサイレージは、それぞれビートパルプペレット、とうもろこしサイレージおよび濃厚飼料の一部と代替が可能である。

5. 残された問題とその対応

- 規格外ニンジンの大量サイレージ調製方法
- その他農産副産物(ナガイモ、ダイコン、タマネギ等)の飼料化