



シネンシス系スターチスの秋の切り花 品質向上と越冬株の上手な管理法


主要品種の栽培特性は？



カナリーダイヤモンド
○ボリュームがある
×6月定植は抽台不安定
×越冬すると品質低下



ゴールデンダイヤモンド
○6月中旬定植でも抽台安定
×越冬すると越冬率、抽台率、
収量やや劣る



キノブラン（標準品種）
道内で最も栽培多い
○6月中旬定植でも抽台安定
○越冬性が最も優れる



キノルージュ
○7月上旬定植でも抽台安定
○二番花の収量多い
×越冬すると枯れる



スーパールビー
○ボリュームがある
×5月中旬定植でも抽台不安定
×越冬しても抽台しない



秋にとれる二番花に向けて遮光処理をしましょう！

5月定植 → 7月下旬～8月上旬採花（一番花） →

遮光
8月1ヶ月間

→ 9月～10月上旬採花（二番花）

■ 2L(千本) ■ L(千本) ■ M(千本) ■ S(千本)



品質・収益性が向上します

- 2L,Lの二番花切り花本数が約1.3～1.6倍になります
- 粗収入額－直接経費が約5～16万円/10a増えます

越冬株は融雪後に地際で刈り込みましょう！

※前年10月にハウス被覆撤去、翌年3月にハウス被覆設置し4月上旬に刈り込んだ場合




刈り込み

刈らないと...



しおれて
しまいます
※病気では
ありません



**安定して
採花できます**

北海道立 花・野菜技術センター 研究部 花き科
〒073-0026 北海道滝川市東滝川735番地
TEL 0125-28-2800 FAX 0125-28-2299
e-mail:seika@agri.pref.hokkaido.jp