

平成25年度 成績概要書

課題コード（研究区分）：3104-325431（経常（各部）研究）

1. 研究課題名と成果の要点

1) 研究成果名：酪農場における堆肥舎整備後の家畜ふん堆肥等の特性と飼料用とうもろこしに対する肥効評価

（研究課題名：熟度の異なる家畜ふん堆肥の特性解明と飼料用とうもろこしに対する施用法）

2) キーワード：家畜ふん堆肥、養分含量、雑草種子、飼料用とうもろこし、窒素肥効

3) 成果の要約：堆肥舎整備に伴い、家畜ふん堆肥等の水分、カリは増加、リン酸は減少傾向にあった。腐熟程度は概ね未熟～中熟で、6割程度から雑草が出芽した。窒素肥料換算係数は高水分な堆肥等ほど大きく、水分含量に応じて0.15～0.3に設定した。また、実態調査の成分分析値から堆肥等の性状別に肥料換算値の目安を示した。

2. 研究機関名

1) 担当機関・部・グループ・担当者名：十勝農試研究部生産環境G 研究主任 須田達也
畜試基盤研究部飼料環境G

2) 共同研究機関（協力機関）：（十勝農業改良普及センター）

3. 研究期間：平成23～25年度（2011～2013年度）

4. 研究概要

1) 研究の背景

家畜排せつ物法施行による酪農家の堆肥舎整備後の家畜ふん堆肥等（堆肥（水分84%未満）およびセミソリッド（水分84～87%）、以下堆肥等）は品質の変動が推測されるが、変動状況は明らかではない。また、従来より水分が高い堆肥等の肥効と施用に伴うリスク評価が求められている。

2) 研究の目的

十勝地域における堆肥舎整備後の堆肥中養分含量および雑草種子の実態を明らかにし、既往の養分推定式を検証する。また、飼料用とうもろこしに対する性状の異なる堆肥等の単年施用時の窒素肥効を明らかにする。

5. 研究内容

1) 十勝地域の堆肥等の特性（H23～25年度）

・ねらい：①家畜排せつ物法施行後の堆肥およびセミソリッドの水分・肥料成分含量、②既往の肥料成分簡易推定法の適応性、③堆肥およびセミソリッド中の雑草種子の混入実態と貯留中における変化を明らかにする。
・試験項目等：①十勝西部と中央部の酪農家の堆肥およびセミソリッド89点を採取し、水分含量、肥料成分含量（全窒素（T-N）、リン酸、カリ、アンモニア態窒素（NH₄-N）等）、腐熟度、雑草種子量を調査。②同試料を用いて、電気伝導度（EC）と乾物率（DM）による肥料成分含有率推定式（家畜ふん尿処理・利用の手引き2004）、および0.5M塩酸振とう抽出法を用いたリン酸およびカリ含量の簡易推定法を検証。③堆肥中の雑草種子量調査。

2) 飼料用とうもろこしに対する堆肥等の窒素肥効評価（H23～25年度）

・ねらい：飼料用とうもろこしに対する堆肥およびセミソリッドの単年施用時の窒素肥効を設定する。
・試験項目等：十勝農試場内で試験1)の堆肥等のうち計40点を現物5t/10a単年春施用し、飼料用とうもろこし（品種の早晚性：早生の晩）に対する窒素の肥効を評価。窒素の肥効は、窒素肥料換算係数（＝堆肥等由来の窒素吸収量÷堆肥等由来の全窒素施用量÷化学肥料の窒素利用率）と窒素肥料換算値（＝堆肥等T-N含量（現物%）×10×肥料換算係数）について検討した。

6. 成果概要

1) 採取した堆肥等の約8割は水分80%以上で、4割は84%以上のセミソリッドであった。腐熟程度はほとんどの堆肥およびセミソリッドで未熟から中熟であった。堆肥の成分含量の平均値（現物当たり）は、水分79.5%、T-N 0.51%、リン酸0.28%、カリ0.60%であり、家畜排せつ物法施行以前の報告に比べ、水分、カリは増加、リン酸は低下する傾向が見られた（表1）。セミソリッドの成分含量は堆肥に比べ、T-N、リン酸およびカリ含量が低く、NH₄-N含量が高い傾向が見られた。

2) 既往の成分含量推定式は、窒素とカリでは適合したが、リン酸とNH₄-Nでは適用できなかった。リン酸とカリは0.5M塩酸振とう抽出法による簡易推定が可能であり、さらに、リン酸については簡易型反射式光度計で測定することができた（データ省略）。

3) 採取した堆肥等（主に未熟～中熟）の6割で雑草が出芽し、その量は1～18個体/現物1kgであり、主な草種は広葉ではセイヨウタンポポ、シロクロバ、ギシギシ類、イネ科ではイヌビエ、スズメノカタビラであった。堆肥等中の死滅・休眠を含む雑草種子数は農家によって変動が大きく、貯留期間が1週間以内の堆肥等では15～89個、3ヶ月以上では11～363個/現物1kgであった。貯留中の外部からの雑草持ち込みや、発生雑草の放置等により堆肥等に含まれている雑草種子が増加している事例もあり、貯留期間における雑草を生やさない管理の重要性が示唆された（データ省略）。

4) 飼料用とうもろこしに対する窒素肥料換算係数は0.1～0.5と変動が大きかった。窒素肥料換算係数は、高水分な堆肥等ほど大きく（図1）、水分65%未満：0.15、65～75%：0.2、75～84%：0.25、84～87%：0.3と設定することで一律0.20を用いるよりも推定誤差が減少した（図2）。以上の結果および既往の成果から、飼料用とうもろこしに対する単年・春施用時の堆肥等の肥料換算法を図3に示した。

