

令和8年度 定期作況報告

(9月20日現在)

北海道立総合研究機構 農業研究本部

畜産試験場

I 気 象 概 況

8月下旬：気温は 19.5℃（平年差－0.5℃）、降水量は 70.0mm（平年比 63%）でともに平年並であった。日照時間は 55.3 時間（平年比 139%）で平年よりかなり多かった。

9月上旬：気温は 16.5℃（平年差－2.9℃）で平年よりかなり低かった。降水量は 123.0mm（平年比 359%）で平年よりかなり多かった。日照時間は 43.5 時間（平年比 83%）で平年並であった。

9月中旬：気温は 17.1℃（平年差＋0.6℃）で平年並であった。降水量は 3.0mm（平年比 5%）で平年よりかなり少なかった。日照時間は 64.2 時間（平年比 131%）で平年よりかなり多かった。

以上のことから、本期間は平年と比較して気温はやや低く、降水量は並、日照時間はやや多かった。

	8月下旬			9月上旬			9月中旬		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温（℃）	19.5	20.0	△0.5	16.5	19.4	△2.9	17.1	16.5	0.6
最高気温（℃）	25.3	24.7	0.6	21.0	24.7	△3.7	23.4	21.7	1.7
最低気温（℃）	15.3	16.1	△0.8	12.1	14.8	△2.7	11.6	11.9	△0.3
降 水 量（mm）	70.0	111.1	△41.1	123.0	34.3	88.7	3.0	61.6	△58.6
降水日数（日）	6.0	6.9	△0.9	5.0	4.6	0.4	1.0	4.6	△3.6
日照時間（時間）	55.3	39.8	15.5	43.5	52.1	△8.6	64.2	49.1	15.1

注 1．各数値は旬の平均または合計。△印は減を示す。

注 2．平年値は前 10 か年の平均値。

Ⅱ 作 況

1. 牧草 採草型チモシー（3 番草）

作 況：3 番草 良

事 由：9 月 20 日現在の草丈は、2 年目草地が 59cm と平年より 5cm 高く、3 年目草地は 62cm と平年より 15cm 高かった。2 年目草地については、前年 5 月 13 日に播種したものの高温の影響により定着しなかったため、平年よりも 103 日遅い 8 月 22 日に再播種を行った。このため、個体サイズが平年と比べ小さく、1 番草の収量が 3 年目草地より少なかった。これらを踏まえ、2 年目草地は参考値とし、作況の判断は 3 年目草地に基づいて行うものとする。

以上のことから、3 番草の作況は「良」である。

調査項目	2年目草地			3年目草地		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較
草丈（cm）（9月20日）	59	54	5	62	47	15
生育日数（日）	53	47	6	53	47	6

注 1) 平年値は2年目草地が前7カ年のうち最豊年（令和2年）及び最凶年（令和1年）を除く5カ年の平均値、3年目草地は前7カ年のうち最豊年（令和2年）及び最凶年（令和1年）を除く5カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

2. サイレージ用とうもろこし

作 況：並

事 由：本年の収穫期は平年より 6 日遅い 9 月 18 日、収穫時の熟度は平年より進んだ黄熟後期であった。生草収量は茎葉、総体では平年値を上回ったが、雌穂ではやや下回った。

以上のことから、目下の作況は並である。

項 目	本年	平年	比較
収穫期(月日)	9.18	9.12	6
収穫時熟度	黄後	黄初-黄中	-
茎葉生草収量(kg/10a)	4,194	4,071	123
雌穂生草収量(kg/10a)	1,593	1,667	△ 74
総体生草収量(kg/10a)	5,788	5,737	51

注 1) 平年値は前7カ年のうち最豊年（令和2年）と最凶年（令和1年）を除く5カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

3) 供試品種は「KD320」。